



ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

Comparison of the Effect of Circular Resistance Training and Intense Functional Training on the Physical Performance of Military Forces

Dariush Nasiri¹ MSc Student, Mohammad Reza Izadi¹ * PhD, Ahmad Reza Yousefpour Dehaqani¹ PhD Candidate, Morteza Naji¹ PhD

¹ Department of Physical Education & Sports Sciences, Faculty of Social & Cultural Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

ABSTRACT

AIMS: The nature of military activity requires that a military person always have cardio-respiratory fitness and sufficient strength. The present study was conducted to compare the effect of circular resistance and intense functional training on the physical performance of military forces.

MATERIALS AND METHODS: In this semi-experimental study with a pre-test-post-test design, among all the male military forces of an operational military center in Ahvaz, Iran 45 people were selected as available and were randomly assigned to three groups: intense functional training, circuit resistance training, and the control group. In the pre-test level, measurements of height, weight, maximum oxygen consumption, and anaerobic power were performed and then the training level began. The training protocol consisted of eight weeks and three training sessions each week. Finally, 24 hours after the end of the training phase, at the post-test level, the desired measurements were performed again. Data were analyzed by dependent t, covariance, and Bonferroni post hoc test using SPSS 19 software.

FINDINGS: The results showed that there was no significant difference between the groups in the variables of age, height, and weight, and the groups were homogeneous in these three variables. Intense functional training and circular resistance training had a significant effect on increasing aerobic power ($p < 0.05$) and increasing anaerobic power ($p < 0.05$). The results indicated a significant improvement in aerobic and anaerobic power indices due to HIFT training compared to circular resistance training ($p < 0.05$).

CONCLUSION: The results of the present study showed that both types of HIFT and circular resistance training increase aerobic capacity, improve anaerobic capacity, and improve the endurance of military forces. In general, the results of the present study emphasize the importance of HIFT training compared to circular resistance training on the physical performance of military forces.

KEYWORDS: Resistance Training; Physical-functional fitness; Military Personnel

How to cite this article:

Nasiri D, Izadi MR, Yousefpour Dehaqani AR, Naji M. *Comparison of the Effect of Circular Resistance Training and Intense Functional Training on the Physical Performance of Military Forces.* J Police Med. 2023;12(1):e20.

*Correspondence:

Address: Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Social and Cultural Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran, Postal Code: 1698715861
Mail: izadi.mreza@gmail.com

Article History:

Received: 05/04/2023
Accepted: 30/10/2023
ePublished: 10/11/2023

Comparison of the Effect of Circular Resistance Training and Intense Functional Training on the Physical Performance of Military Forces

INTRODUCTION

Military organizations and armies always consider their workforce the most valuable treasure and powerful tool for victory [1]. Defeat or victory in a battle scene, in addition to weapons and technology, depends on the physical and mental health and the level of physical fitness of the forces. The military has always played an important role in battle [1, 2]. All kinds of strength, endurance, and combined training improve the practical readiness of military force. Complete preparation leads to a person performing best under weather and environmental conditions. Combat fitness comes from exercises that develop physical skills and bodybuilding exercises that increase strength and endurance [2, 3].

The nature of military activity requires the military force to be physically fit in peacetime or wartime. Military missions, especially on the battlefield, require high physical fitness. Also, exposure to various environmental and temperature conditions strengthens this level of military training. Based on this, physical activity and training programs to achieve physical and mental health are the main foundation of all military training in different parts of the world and play a very important role in the emergence of latent talents [1-3]. Despite the effectiveness of traditional resistance training programs in developing muscle strength, modern resistance training, in addition to improving muscle strength, also improves strength in endurance and speed [4]. The American College of Sports Medicine recommends two to four sets of 8 to 12 repetitions per major muscle group for beginners (with approximately 60% of one repetition max on two to three non-alternating days per week). Also, 2-3 minutes of rest between sets is recommended for proper recovery. This recommendation often increases muscle strength, endurance, and hypertrophy among untrained individuals [5]. Another type of training, which is called circular training, strengthens the cardiovascular and muscular systems due to the nature of strength and endurance. In addition, due to the issue of time efficiency and the effectiveness of training in improving aerobic and anaerobic capacity, circuit training is used in shorter training sessions instead of traditional strength training [1]. Like traditional strength training, traditional circuit training follows specific reps, sets, and rest schedules using resistance or body weight [5]. Circuit-based training programs have gained popularity due to their practicality and efficiency with limited time. A combination of cardiovascular and resistance training in a higher-intensity limited-rest design has been reported to result in numerous health and fitness

benefits in less time than traditional programs [6]. In addition, *Chtara et al.* (2008) reported that a 12-week low-frequency circuit resistance training program improved muscle strength, endurance, and power [7].

In addition to resistance training, today, high-intensity functional training (HIFT), also known as Cross Fit, is used among various people. HIFT utilizes a variety of sports activities, such as monostructural movements (such as running and rowing), weight-bearing exercises (squats and Swedish swimming), and weightlifting derivatives (shoulder press, deadlift) [8]. Unlike intense interval training that relies on single activities such as running, HIFT emphasizes functional, multi-joint exercises that can be adjusted for any fitness level and produce greater muscle recruitment with aerobic and strength-muscular exercise activities [8, 9]. HIFT is a relatively new training model that has recently appeared in the fitness industry. Attention to HIFT may be mainly due to participants' strong empathy, which increases adherence to the exercise program compared to traditional resistance training methods [10]. Various studies have acknowledged the high caloric expenditure rate of HIFT exercises similar to that of intense circuit training [8, 9]. From a physiological point of view, studies such as *Banaszek* (2018) and *Brisebois* (2018) suggest that HIFT may improve body composition [11, 12] and, according to *Marin et al.* (2018), increase aerobic capacity [12,13], while *Andersen* (2005) believes, this type of training also increases absolute and relative strength [10].

Strength training, in turn, improves muscle strength, provides better support for muscles and joints, and improves a person's body composition. These exercises, with mechanisms related to hypertrophy, develop the strength and structure of small and large muscles [15]. Researchers believe that strength or resistance training improves a person's general balance by improving skeletal stability and proprioception [16]. Studies have shown that these exercises can reduce the negative effects of endurance training, such as oxidative stress, increased inflammation, increased cortisol levels, and muscle disorders [17, 18]. Suppose resistance training is combined with cardio-respiratory strengthening exercises in the form of circular resistance exercises in athletes, especially military forces. In that case, it can prevent injuries and rehabilitate existing injuries in addition to improving aerobic and anaerobic efficiency [18]. Intense functional training has been identified as a valuable and appropriate training program for military forces [19, 20], and it has been reported how programs that combine aspects of resistance

training with aerobic and body weight training have the potential to be more effective than traditional military training. They are perfect for improving anaerobic and aerobic capacity in more time. *Hinrish et al.* investigated the effects of a traditional military physical training program and a circuit-style HIFT program among active duty military forces. After eight weeks of training, the circuit-style HIFT program group significantly increased their strength, aerobic capacity, and flexibility compared to the traditional military physical training group [9]. Although in the military, few studies have been published examining the effects of HIFT on some aspect of health-related fitness or comparing the effects of HIFT to traditional resistance training, a search of databases by the researcher found no studies comparing HIFT training and circular resistance exercises in the military forces. Therefore, given that HIFT and circuit resistance training are both used as efficient methods to improve health and fitness and share some basic principles, including repeated activities with short brief rests, in this study, the effect of these exercises on the physical performance of military forces were examined so that the best training program can be achieved in order to improve their physical fitness.

MATERIALS & METHODS

The current study is a semi-experimental research with a pre-test-post-test design with two experimental and one control group. The statistical population of this research was all male military forces of an operational military center in Khuzestan province in Iran, with 400 people. The number of samples in this research was calculated based on G Power 3.1.9.2 software. The minimum sample size was 36 people (twelve people in each group) using an alpha of 5%, a beta of 80%, and an effect size of 0.30. The samples were selected as available and randomly placed in 3 groups: intense functional training, circuit resistance training, and control. The inclusion criteria for this research are healthy young men aged 30-35 years, body mass index between 20 and 24.9 kg/m², not having any cardiovascular disease, diabetes, orthopedic/neural limitations, not having depression according to the Beck Depression Questionnaire, non-smoking and non-use of special drugs. People injured during the study who could not complete the exercise program or had more than two consecutive absent sessions were excluded from the study process. It was also explained to people that they can withdraw from the research process if they do not want to continue cooperation. A Seka digital scale was used to measure the weight of the samplings, and a tape measure was used to

measure the height of the samplings. In addition, the Rockport walking test was used to measure the maximum oxygen consumption. The Rockport Walking Test was administered by asking samples to walk one mile (1.6 km) as fast as possible. Before the test, the samples did 5 to 10 minutes of light stretching. The samples' pulse was taken for one minute, and as soon as the test was finished (counting the pulse by touching the carotid artery in 15 seconds and multiplying it by 4 to calculate the number of beats per minute). Also, the RAST training protocol was used to perform anaerobic power. The protocol consisted of 6 levels of 35 m running at maximum speed with 10 seconds of rest between each level. The samples first warmed up their bodies for 10 minutes. The duration of the RAST test at each level was recorded in seconds and hundredths of a second at a distance of 35 meters in the sports hall. Each sample started to move from the starting line, and the timer stopped after crossing the finish line. After 10 seconds, the second round of running started. Each sample covered a distance of 35 meters six times at full speed, and the time for each step was recorded. In this study, the individual's maximum power was obtained using the highest numerical value obtained from the RAST test regarding watts. For this purpose, the relationship between the square of the distance covered and the cube of the elapsed time to cover a distance of 35 meters was used. Also, the minimum power obtained from the RAST test, in watts, was considered using the relationship of weight multiplied by the ratio of the square of the distance traveled by the cube of the time spent in the distance of 35 meters. Since people had to walk a distance of 35 meters six times while performing the RAST test, the sum of each of the powers obtained in each step was divided by six, which indicated the average power of the person under investigation [21]. In a briefing session that was held one week before the start of the training protocols, all plans, possible benefits, and risks, the correct way of performing circular resistance exercises and intense performance were explained to the participants, and considering the training intervention in this research and preventing interference effects with drugs. The samples were asked to avoid taking any drugs during the training period, especially blood pressure-lowering drugs, and to report if they did. Of course, during the implementation of the research, all the samples were controlled under the supervision of a specialist doctor to avoid any possible risks. After familiarizing the samples with the work implementation levels, they were randomly divided into three groups (circular resistance exercises,

Comparison of the Effect of Circular Resistance Training and Intense Functional Training on the Physical Performance of Military Forces

intense functional exercises, and control). At first, in the pre-test level, measurements of height, weight, maximum oxygen consumption, and anaerobic capacity were measured from 8:00 a.m. to 10:00 a.m. in the sports hall of one of the operational centers of Khuzestan province in Iran. After the pre-test level, the practice began. The training phase was carried out in eight weeks and three sessions per week (from 8 to 10 a.m.) in the sports hall of one of the operational centers of Khuzestan province. During this time, the control group did their daily activities, and the training groups implemented the designed training protocols. During the training program's implementation, the training overload principle was also controlled by increasing the intensity and volume of the training pyramid. The exercise protocol of the present study was taken from the research of *Banaszek et al. (2019) [11] (Tables 1 and 2)*. In this training protocol, in all weeks and all sessions, the time of each movement was 40 seconds, each movement was three repetitions, and rests were 20 seconds between each repetition and 60 seconds between each station.

Table 1) Characteristics of the components of intense functional exercises

Variable	Characteristic
Performed Activities	Integrated resistance exercises, including upper and lower limb simultaneous exercises, multi-planar movements, central stability exercises, movement coordination and balance.
Intensity	week 1-8; Pressure perception index 6-7 (0-10)
Volume Course. Method	Circuit design with 8 stations (exercise), 40 seconds of exercise, 20 seconds of rest, 3 repetitions, 25 minutes total

The circuit resistance training protocol was designed and implemented for eight weeks and three sessions each week based on the study of *Sobrero et al. (2017) [5]*. The levels of circular resistance training were: ten minutes of warm-up in the form of low-intensity running, about 60% of the maximum heart rate and stretching movements at the beginning of the session, a specific training protocol, and finally, ten minutes of soft running and stretching movements at the end of each training session. The resistance training protocol was designed circularly, including eight stations. A few days before the test, briefing sessions were held to get familiar with the training stations, the correct principles of weight training, the volume and intensity of training, the number of repetitions and rest time between machines and courses, and a maximum repetition of the desired movements for the first four weeks and the second four weeks were measured at the end of the fourth week using the indirect method and the Brzycki formula. The resistance training program, based on the scientific

principles of circular resistance training design and the scientific principles of sports physiology, began with the use of large body muscles and ended with the exercise of smaller body muscles in the form of one upper body movement and one lower body movement (**Table 3**). 24 hours after the end of the training level, in the post-test, measurements of aerobic power and anaerobic power were performed from 8 to 10 a.m. in the sports hall of the studied military center.

Table 2) Protocols of intense functional exercises

Weeks	Exercise	Type of exercise
1 and 5	Sit-to-stand with elbow flexion	body weight
	Push-ups	body weight
	Crunches with rotation	body weight
	Dumbbell swing	No body weight
	Front pulldown with squat	Elastic bands
	Good morning	No body weight
	Side-lying hip abduction	body weight
	Airplane	body weight
2 and 6	Upright row with sumo squat	body weight
	Dumbbell fly with pelvic elevation	No body weight
	Elastic trunk rotation	Elastic bands
	Front raise with side lunge	No body weight
	Suspended row	body weight
	Knee flexion with elbow flexion	body weight
	Trunk lateral flexion	body weight
	Single leg balance with eyes closed	body weight
3 and 7	Squat thruster	body weight
	Hip flexion with elbow flexion	Elastic bands
	Ball crunch	body weight
	Side lateral raise with lunge	body weight
	Horizontal row	Elastic bands
	Stiff leg deadlift	No body weight
	Bench press	body weight
	Single leg balance with eyes closed	body weight
4 and 8	Standing bench press	body weight
	Sumo squat	body weight
	Horizontal row	body weight
	Crunch	body weight
	Push forward	body weight
	Hips extension	body weight
	Shoulder abduction/adduction	body weight
	Trunk rotation	body weight

Ethical Permission: All the levels of the present study were carried out according to the ethics guidelines in biomedical research with the ethics ID IR.US.PSYEDU.REC.1402.062. The participants were assured that their personal information would be kept confidential by the researchers and would be reported in a general form. They were also allowed to withdraw at any level of the training if they did not want to continue cooperation. All samples were given a consent form to voluntarily

declare their readiness to participate in the training protocols.

Statistical analysis: Descriptive statistics were used to calculate central and dispersion indices. The Shapiro-Wilk test was used to check the normality of the data. In the inferential statistics section,

covariance analysis and the Bonferroni post hoc test were used to compare between groups, and the dependent t-test was used to examine intragroup effects. Data analysis was done using SPSS 22 software at a significance level of 0.05.

Table 3) Circular resistance training protocol

Week	Basic exercises	Intensity	Set	Repetition	Rest	Cool-down
First	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition max 65%	4 sets	repetitions 8	No rest between reps, 1 minute rest between sets, 15 seconds rest between stations	
Second	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition max 65%	4 sets	repetitions 8	No rest between reps, 1 minute rest between sets, 15 seconds rest between stations	
Third	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition maximum 70%	4 sets	repetitions 9	No rest between reps, 1.30 minutes rest between sets, 15 seconds rest between stations	
Fourth	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition maximum 70%	4 sets	repetitions 9	No rest between reps, 1.30 minutes rest between sets, 15 seconds rest between stations	
the fifth	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition max 75%	3 sets	repetitions 10	seconds rest between each rep, 2 5 minutes rest between each set, 15 seconds rest between each station	Gentle jogging and stretching
the sixth	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition max 75%	3 sets	repetitions 10	seconds rest between each rep, 2 5 minutes rest between each set, 15 seconds rest between each station	
the seventh	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition maximum 80%	2 sets	repetitions 11	seconds rest between each repetition, 2.30 minutes rest between each set, 15 seconds rest between each station	
Eighth	Chest press, leg press, bar pull down (armpit), twin with machine, front arm, back of thigh with machine, lateral release with dumbbell (cross), shoulder with barbell	of one repetition maximum 80%	2 sets	repetitions 11	seconds rest between each repetition, 2.30 minutes rest between each set, 15 seconds rest between each station	

FINDINGS

The results showed that between the groups in the variables of age ($p=0.46$; $F=0.78$), height ($p=0.63$; $F=0.46$), and weight ($p=0.06$; $F=2.99$) F) was no significant difference, and the groups were homogeneous in these three variables (Table 4). Concerning the aerobic capacity index, the results showed that intense functional training had a significant effect on the aerobic capacity of military forces ($p=0.001$), and as a result of this type of training, the average aerobic capacity of military forces from the pre-test (40.60 ± 3.48) to the post-test (50.06 ± 3.03) increased significantly (Table 5). On the other hand, circular resistance training also had a significant effect on the aerobic capacity of military forces ($p=0.003$). In general, the groups of intense functional and circular resistance exercises had higher aerobic capacity than the control group ($p<0.05$). Other results indicated that the intense functional training group had higher aerobic capacity compared to

the circular resistance training group ($p<0.05$) (Table 5).

Concerning the peak anaerobic power index, the results showed that intense functional training significantly affected the peak anaerobic power of military forces ($p=0.001$). As a result of intense functional training, the average peak anaerobic power of military forces increased significantly from the pre-test (598.73 ± 13.23) to the post-test (656.73 ± 20.44) in terms of watts. Also, circular resistance training significantly affected the peak anaerobic power of military forces ($p=0.007$). In general, the groups of intense functional and circular resistance exercises had higher peak anaerobic power than the control group ($p<0.05$). Other results indicated that the intense functional training group had higher peak anaerobic power compared to the circular resistance training group ($p<0.05$) (Table 5).

With the average anaerobic power index, the results showed that intense functional training

studied center were selected with low physical activity levels. In the research of *Sobrero et al.*, the participants were healthy women active in recreational sports. The results of the present study support the argument of *Kraemmer et al.* regarding the lack of improvement in the aerobic and anaerobic capacity of active men due to intense resistance training programs after 12 weeks [24]. Recently, *Hermassi et al.* have further supported the effectiveness of circuit training programs in high-level athletes by demonstrating significant improvements in muscle strength, power, and throwing speed in a group of handball players over a 10-week competitive season [25]. However, the results of some studies indicate that circular exercises prescribed with the intensity and speed of movement are not optimal for building muscle power and strength and, as a result, sports performance [26]. Exercises using explosive movement patterns and higher loads for the lower body and moderate loads for the upper body (such as high-intensity functional training) are more beneficial because the goal is to produce maximal power during circuit training [27]. Therefore, circuit training programs that use high-intensity interval training (HIFT) and explosive exercises can have even better results in developing physical fitness and aerobic capacity. Other results of the present study showed that intense functional training significantly increased peak anaerobic power, average anaerobic power, and minimum anaerobic power of military forces. Also, the participants of the intense functional training group had statistically higher peak anaerobic power, average anaerobic power, and minimum anaerobic power than the participants of the circular resistance training group. In a study consistent with the results of the present study, *Bahreman et al.* compared CrossFit exercises and combined exercises (aerobic+resistance) and showed that the average anaerobic power and peak anaerobic power improved more as a result of CrossFit exercises than combined exercises [22]. However, the results of the present study could be more consistent with the study of *Mcweeny et al.* The results of his study show that the anaerobic power of the lower body in the participants of traditional exercises is higher than that of intense functional exercises [23]. One of the reasons for the inconsistency is the type of exercise, which in *Mcweeny et al.*'s study was traditional resistance exercise.

In contrast, in the present study, it was a circular resistance exercise. In addition, in the current research, the samples included military forces (inactive men). While in *Mcweeny et al.*'s research, the samples included healthy men and women, this gender difference (especially the male samples

participating in *Mcweeny et al.*'s research) can be one of the reasons for improving anaerobic power due to traditional resistance exercises. Although the participants of intense functional training compared to circuit resistance training in the present study had higher anaerobic power, in a discordant study by *Sobrero et al.*, no change in anaerobic capacity was observed between the two training groups [22]. One of the reasons for this difference can be related to the preparation level of the participants.

The main advantage of HIFT is that it can target several systems in the body in one session by increasing aerobic and anaerobic capacity, endurance, strength, and muscle power while positively affecting body composition and work capacity [8, 28]. Similar interventions have shown positive results in athletes [25], and a recent study showed that HIFT produced similar improvements in 5 km performance in recreational runners using a shorter duration [29]. The multimodal nature of HIFT could provide an efficient alternative to traditional circuit and resistance training. Among the limitations of the current research are the researcher's inability to control all the internal and external risk factors of injury and the lack of precise control of the nutrition of the research samples. It is suggested that the acute effect of intense functional and circular resistance exercises on the physical performance and obstacle field test of military forces be compared in future research. Also, the effect of these two types of exercise on cardiac risk factors, glucose, and insulin sensitivity of military forces should be compared.

CONCLUSION

Based on the results, compared to the control group, both types of HIFT and circular resistance exercises increase aerobic power, improve anaerobic capacity, and improve the endurance of military forces. The results of the present study show that HIFT exercises are probably more effective than circular resistance exercises on the physical performance and combat power of military forces. Also, military trainers are advised that according to the time conditions, they should use intense functional training rather than circular resistance exercises to improve the aerobic and anaerobic capacity of the military forces.

Clinical & Practical Tips in POLICE MEDICINE: Performing HIFT and circular resistance exercises can increase aerobic capacity, improve anaerobic capacity, and improve the endurance of military forces and especially police operational forces in all kinds of pursuits and other missions. Carrying out this type of exercise

Comparison of the Effect of Circular Resistance Training and Intense Functional Training on the Physical Performance of Military Forces

and creating training in the mission scene delays the process of causing cardiovascular injuries in the forces with long service history and the retired forces. HIFT training can be the best way to improve physical fitness, neuromuscular coordination, and agility for police entry in various international military competitions.

Acknowledgments: This article is a part of the master's thesis of the first author. The authors thank all those who have cooperated in this research.

Conflict of interest: The authors stated that the present study has no conflict of interest.

Authors' Contribution: Mohammadreza Izadi, Ahmadreza Yousefpour, and Morteza Naji; Presenting the idea and design of the study, data collection, and statistical data analysis; Daryoosh Nasiri, data interpretation and data collection; Daryoosh Nasiri and Mohammad Reza Izadi collected data and analyzed data; All the authors participated in the initial writing of the article and its revision, and all accept the responsibility for the accuracy and correctness of the contents of this article with the final approval of this article.

Financial Sources: This study had no financial support.



نشریه طب انتظامی

دسترسی آزاد

مقاله اصیل

مقایسه اثر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و تمرینات عملکردی شدید بر عملکرد جسمانی کارکنان نظامی

داریوش نصیری¹ MSc Student، محمدرضا ایزدی^{1*} PhD، احمدرضا یوسفپور دهاقانی¹ PhD Candidate، مرتضی ناجی¹ PhD

¹ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

اهداف: ماهیت فعالیت نظامی ایجاب می‌کند تا فرد نظامی همواره از آمادگی قلبی-تنفسی و توان کافی برخوردار باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و تمرینات عملکردی شدید بر عملکرد جسمانی کارکنان نظامی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون، از بین تمامی کارکنان نظامی مرد یک مرکز نظامی عملیاتی در شهر اهواز، ۴۵ نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات عملکردی شدید، تمرینات مقاومتی دایره‌ای و گروه کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش‌آزمون اندازه‌گیری‌های قد، وزن، اکسیژن مصرفی بیشینه و توان بی‌هوایی انجام شد. در ادامه، مرحله تمرینی آغاز شد. پروتکل تمرینی شامل هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرین بود. در نهایت، ۲۴ ساعت بعد از اتمام مرحله تمرینی، در مرحله پس‌آزمون، اندازه‌گیری‌های مورد نظر مجدداً انجام شد. داده‌ها به روش تی وابسته، کوواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19 تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد، بین گروه‌ها در متغیرهای سن، قد و وزن تفاوت معناداری وجود نداشت و گروه‌ها در این سه متغیر همگن بودند. تمرینات عملکردی شدید و تمرینات مقاومتی دایره‌ای در افزایش توان هوازی ($p < 0/05$) و افزایش توان بی‌هوایی ($p < 0/05$) تأثیر معناداری داشت. نتایج حاکی از بهبود معنادار شاخص‌های توان هوازی و توان بی‌هوایی در اثر تمرینات HIFT در مقایسه با تمرینات مقاومتی دایره‌ای بود ($p < 0/05$).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد هر دو نوع تمرین HIFT و مقاومتی دایره‌ای موجب افزایش توان هوازی، بهبود ظرفیت بی‌هوایی و نیز بهبود استقامت کارکنان نظامی می‌شود. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت تمرینات HIFT در مقایسه با تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر عملکرد جسمانی کارکنان نظامی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها: تمرینات مقاومتی، آمادگی جسمانی-عملکردی، نیروی نظامیان

<p>تاریخچه مقاله:</p> <p>دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶</p> <p>پذیرش: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸</p> <p>انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۹</p>	<p>نویسنده مسئول*:</p> <p>آدرس پستی: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران، کد پستی: ۱۶۹۸۷۱۵۸۶۱</p> <p>پست الکترونیکی: izadi.mreza@gmail.com</p>	<p>نحوه استناد به مقاله:</p> <p>Nasiri D, Izadi MR, Yousefpour Dehaqani AR, Naji M. Comparison of the Effect of Circular Resistance Training and Intense Functional Training on the Physical Performance of Military Forces. J Police Med. 2023;12(1):e20.</p>
--	---	--

مقدمه

سازمان‌های نظامی و ارتش‌های جهان همواره نیروی انسانی خود را ارزشمندترین گنجینه و پرتوان‌ترین ابزار پیروزی قلمداد می‌کنند [۱]. شکست یا پیروزی در یک صحنه نبرد علاوه بر تسلیحات و تکنولوژی، به سلامت جسم و روان و میزان آمادگی جسمانی نیروها بستگی دارد و همواره آمادگی جسمانی نظامیان نقش مهمی در نتیجه یک نبرد داشته است [۱، ۲]. انواع تمرینات قدرتی، استقامتی و ترکیبی، سبب بهبود آمادگی عملی افراد نظامی است. آمادگی کامل منجر می‌شود تا فرد تحت هر شرایط آب و هوایی و محیطی بهترین عملکرد را داشته باشد. از ترکیب تمریناتی که باعث توسعه مهارت‌های بدنی می‌شوند و بدنسازی‌هایی که قدرت و استقامت را افزایش می‌دهند، آمادگی رزمی به وجود می‌آید [۲، ۳].

ماهیت فعالیت نظامی ایجاب می‌کند تا نیروی نظامی در زمان صلح یا در زمان جنگ از آمادگی بدنی مناسبی برخوردار باشد. مأموریت‌های نظامی و به خصوص صحنه نبرد، سطح بالایی از آمادگی جسمانی را طلب می‌کند. همچنین قرار گرفتن در شرایط محیطی و دمایی گوناگون، این سطح از حساسیت ورزشی نظامیان را قوت می‌بخشد. بر این اساس، فعالیت بدنی و برنامه‌های تمرینی به عنوان ابزاری برای رسیدن به سلامت جسمانی و روانی، زیربنای اصلی تمام آموزش‌های نظامی در نقاط مختلف جهان است و نقش بسیار مهمی در بروز استعدادها و نهفته افراد دارد [۳-۱]. علی‌رغم اثربخشی برنامه‌های تمرین مقاومتی سنتی در پیشرفت قدرت عضلانی، تمرینات نوین مقاومتی علاوه بر بهبود قدرت عضلانی، قدرت در استقامت و قدرت در سرعت را نیز بهبود می‌بخشد [۴]. دانشکده پزشکی ورزشی آمریکا، دو تا چهار مجموعه ۸ تا ۱۲ تکرار در هر گروه بزرگ عضلانی را برای مبتدیان (با تقریباً ۶۰ درصد حداکثر یک تکرار بیشینه در دو تا سه روز غیرمتناوب در هفته را) توصیه می‌کند. همچنین دو تا سه دقیقه استراحت بین مجموعه‌ها برای ریکاوری مناسب توصیه می‌شود. این توصیه اغلب منجر به افزایش قدرت عضلانی، استقامت و هایپرتروفی در بین افراد غیرآموزش‌دیده می‌شود [۵]. اما نوع دیگری از تمرین که آن را تمرینات دایره‌ای می‌نامند، به دلیل ماهیت توانی و قدرت در استقامت، علاوه بر سیستم عضلانی، موجب تقویت سیستم قلبی-عروقی می‌گردد. علاوه بر این، به دلیل مسئله کارایی زمان و اثرگذاری تمرین در بهبود ظرفیت هوازی و بی‌هوازی، به جای تمرینات قدرتی سنتی در یک جلسه تمرین کوتاه‌تر، از تمرین دایره‌ای استفاده می‌شود [۱]. دقیقاً مانند تمرینات قدرتی سنتی، تمرینات دایره‌ای سنتی به طور معمول از تکرارها، ست‌ها و برنامه‌های استراحت مشخص با استفاده از مقاومت در برابر وزنه یا وزن بدن پیروی می‌کند [۵]. برنامه‌های تمرینی دایره‌ای محور به دلیل کاربردی بودن و کارایی با محدودیت زمانی، محبوبیت یافته‌اند. گزارش

شده است که ترکیبی از تمرینات قلبی-عروقی و مقاومتی در یک طراحی استراحت محدود با شدت بالاتر، منجر به مزایای بی‌شماری در سلامتی و تناسب اندام در مدت زمان کمتری نسبت به برنامه‌های سنتی می‌شود [۶]. علاوه بر این، *Chtara* و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کرده‌اند که یک برنامه تمرینی مقاومتی دایره‌ای ۱۲ هفته‌ای با فرکانس پایین، منجر به بهبود قدرت عضلانی، استقامت و قدرت می‌شود [۷].

علاوه بر تمرینات مقاومتی، امروزه از تمرینات نوینی به نام تمرین فانکشنال شدید (HIFT) که تحت عنوان Cross Fit نیز شناخته می‌شود، در بین افراد گوناگون استفاده می‌شود. HIFT از انواع ماهیت‌های فعالیت ورزشی از قبیل فعالیت‌های هوازی تک‌ساختاری (مثل دویدن و قایقرانی)، حرکات تحمل وزن بدن (اسکات و شنا سوئدی) و مشتقات وزنه‌برداری (پرس سرشانه، لیفت مرده) بهره می‌برد [۸]. برخلاف تمرینات تناوبی شدید که به فعالیت‌های تکی مثل دویدن متکی است، HIFT بر حرکات عملکردی و چندمفصله تأکید دارد که می‌تواند برای هر سطح آمادگی تعدیل گردد و فراخوانی عضلانی بزرگتر همراه با فعالیت‌های ورزشی هوازی و قدرتی-عضلانی را ایجاد کند [۸، ۹]. به طور کلی HIFT یک مدل تمرینی نسبتاً نوین است که اخیراً در صنعت آمادگی جسمانی دیده می‌شود. توجه به HIFT ممکن است تا حدود زیادی به دلیل همدلی قوی شرکت‌کنندگان باشد که باعث افزایش وابستگی به برنامه تمرینی در مقایسه با شیوه‌های سنتی تمرین مقاومتی می‌شود [۱۰]. مطالعات مختلفی اذعان کرده‌اند، نرخ مصرف بالای کالری تمرینات HIFT مشابه با تمرینات دایره‌ای شدید است [۸، ۹]. از جنبه فیزیولوژیکی، مطالعاتی مانند مطالعه *Banaszek* (۲۰۱۸) و *Brisebois* (۲۰۱۸) پیشنهاد می‌کنند که HIFT ممکن است باعث بهبود در ترکیب بدنی [۱۱، ۱۲] شود و طبق نظر *Marin* و همکاران (۲۰۱۸) موجب افزایش ظرفیت هوازی [۱۲، ۱۳] شود، در حالی که *Andersen* (۲۰۰۵) معتقد است، این نوع تمرینات قدرت مطلق و نسبی را نیز افزایش می‌دهد [۱۰]. تمرینات قدرتی به نوبه خود سبب ارتقای قدرت عضلانی، پشتیبانی بهتر عضلات از مفاصل و نیز موجب بهبود ترکیب بدنی فرد می‌شود. این تمرینات با ساز و کارهای مرتبط با هایپرتروفی، موجب توسعه قدرت و توسعه ساختار عضلات ریز و درشت می‌شوند [۱۵]. پژوهشگران معتقدند، تمرینات قدرتی یا مقاومتی، به واسطه بهبود پایداری اسکلتی و حس عمقی، سبب بهبود تعادل عمومی فرد نیز می‌شوند [۱۶]. مطالعات نشان داده‌اند این تمرینات می‌تواند اثرات منفی ناشی از تمرینات استقامتی همچون استرس اکسیداتیو، افزایش التهاب، افزایش سطوح کورتیزول و اختلالات عضلانی را کاهش دهد [۱۷، ۱۸]. اگر در افراد ورزشکار و به ویژه نظامیان، تمرینات مقاومتی با تمرینات تقویت توان قلبی-تنفسی در قالب تمرینات مقاومتی دایره‌ای

عصبی، نداشتن افسردگی بر اساس پرسش‌نامه افسردگی Beck، عدم استعمال دخانیات و عدم استفاده از داروهای خاص بود. افرادی که در مدت مطالعه دچار آسیب شدند یا نتوانستند برنامه تمرینی را به طور کامل انجام دهند یا بیش از دو جلسه غیبت متوالی داشتند، از روند مطالعه حذف شدند. همچنین برای افراد شرح داده شد که در هر زمان از مراحل انجام تحقیق در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری می‌توانند انصراف دهند.

از ترازوی دیجیتال سکا جهت اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها و از متر نواری جهت اندازه‌گیری قد آزمودنی‌ها استفاده شد. علاوه بر این، برای اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون راه‌رفتن راکپورت که به صورت میدانی انجام می‌شود، استفاده شد. تست راه رفتن راکپورت بدین صورت اجرا شد که از آزمودنی‌ها خواسته شد یک مایل (۱/۶ کیلومتر) را تا آنجا که می‌توانند به تندی راه بروند. آزمودنی‌ها قبل از شروع آزمون، ۵ الی ۱۰ دقیقه حرکات کششی سبک انجام دادند. گرفتن نبض آزمودنی‌ها به مدت یک دقیقه و به محض اتمام آزمون، انجام شد (شمارش نبض از راه لمس سرخرگ کاروتید در ۱۵ ثانیه و سپس ضرب تعداد آن در ۴ برای محاسبه تعداد ضربان در دقیقه). همچنین، برای انجام توان بی‌هواری از پروتکل تمرینی RAST استفاده شد. این پروتکل شامل ۶ مرحله ۳۵ متر دویدن با حداکثر سرعت با ۱۰ ثانیه استراحت بین هر مرحله بود. برای اجرای این آزمون، ابتدا آزمودنی‌ها به مدت ۱۰ دقیقه بدن خود را گرم نمودند. مدت زمان اجرای آزمون RAST در هر مرحله، بر حسب ثانیه و صدم ثانیه، به فاصله ۳۵ متر در سالن ورزشی ثبت شد. هر آزمودنی از خط مبدأ شروع به حرکت کرد و با عبور از خط پایان، زمان‌سنج متوقف شد. پس از گذشت ۱۰ ثانیه دور دوم دویدن شروع شد. هر یک از آزمودنی‌ها، مسافت ۳۵ متری را شش بار، با سرعت تمام طی کردند و زمان مربوط به هر مرحله ثبت شد.

در این مطالعه توان بیشینه فرد با استفاده از بیشترین مقدار عددی حاصل از اجرای آزمون RAST بر حسب وات، به دست آمد. برای این کار از رابطه نسبت مربع مسافت طی شده بر مکعب زمان سپری شده برای طی کردن مسافت ۳۵ متر استفاده شد. همچنین توان حداقل حاصل از اجرای آزمون RAST، بر حسب وات، با استفاده از رابطه وزن ضرب در نسبت مربع مسافت طی شده بر مکعب زمان سپری شده در مسافت ۳۵ متر در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه افراد در اجرای آزمون RAST، باید شش بار مسافت ۳۵ متر را طی می‌کردند، مجموع هر یک از توان‌های به دست آمده در هر یک از مراحل، تقسیم بر عدد شش شد که نشان‌دهنده میانگین توان فرد مورد بررسی بود [۲۱]. در یک جلسه توجیهی که یک هفته قبل از شروع پروتکل‌های تمرینی برگزار شد، تمامی برنامه‌ها، مزایا و خطرات احتمالی، شیوه صحیح اجرای تمرینات

ترکیب شوند، می‌تواند علاوه بر بهبود کارآمدی هواری و بی‌هواری، از بروز آسیب‌ها پیشگیری کرده و آسیب‌های موجود را توان بخشی نماید [۱۸].

در چند مطالعه، تمرینات فانکشنال شدید، به عنوان یک برنامه آموزشی ارزشمند و مناسب برای نیروهای نظامی معرفی شده است [۱۹، ۲۰] و گزارش شده است که چگونه برنامه‌هایی که جنبه‌های تمرین مقاومتی را با تمرینات هواری و وزن بدن ترکیب می‌کنند، نسبت به تمرین نظامی سنتی، پتانسیل بسیار خوبی برای بهبود ظرفیت بی‌هواری و هواری در زمان بیشتری دارند. *Hinrish* و همکاران، تأثیرات یک برنامه تمرینی فیزیکی نظامی سنتی و یک برنامه HIFT به سبک دایره‌ای را در بین نیروهای فعال ارتش انجام داده‌اند. پس از هشت هفته آموزش، گروه برنامه HIFT به سبک دایره‌ای به طور قابل توجهی قدرت، ظرفیت هواری و انعطاف‌پذیری خود را در مقایسه با گروه آموزش فیزیکی نظامی سنتی افزایش داده‌اند [۹]. اگرچه در مورد نیروهای نظامی، مطالعات کمی در مورد بررسی اثرات HIFT در برخی از جنبه‌های آمادگی مرتبط با سلامتی یا مقایسه اثرات HIFT با تمرینات مقاومتی سنتی منتشر شده است، اما با جستجوی محقق در پایگاه‌های اطلاعاتی، مطالعه‌ای یافت نشد که به مقایسه بین تمرینات HIFT و تمرینات مقاومتی دایره‌ای در نیروهای نظامی پرداخته باشد. بنابراین با توجه به اینکه HIFT و تمرینات مقاومتی دایره‌ای هر دو به عنوان روش‌های کارآمد برای بهبود سلامتی و تناسب اندام مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی از اصول اصلی از جمله فعالیت‌های مکرر با استراحت‌های مختصر کوتاه را به اشتراک می‌گذارند، در این مطالعه، اثر این تمرینات بر عملکرد جسمانی کارکنان نظامی بررسی شد تا از این طریق بتوان به بهترین برنامه تمرینی در راستای بهبود آمادگی جسمانی ایشان دست یافت.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی کارکنان نظامی مرد یک مرکز نظامی عملیاتی در استان خوزستان به تعداد ۴۰۰ نفر بود. تعداد نمونه تحقیق حاضر بر اساس نرم‌افزار *G Power 3.1.9.2* محاسبه شد. حداقل اندازه نمونه، ۳۶ نفر (دوازده نفر در هر گروه) با استفاده از آلفای ۵ درصد، بتای ۸۰ درصد و اندازه اثر ۰/۳۰ به دست آمد. نمونه‌ها به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در ۳ گروه تمرینات عملکردی شدید، تمرینات مقاومتی دایره‌ای و کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود به این پژوهش، مردان جوان سالم، سن ۳۵-۳۰ سال، شاخص توده بدنی بین ۲۰ تا ۲۴/۹ کیلوگرم بر مترمربع، نداشتن هرگونه بیماری قلبی-عروقی، دیابت، محدودیت ارتوپدی/

نوع ورزش	تمرین‌ها	هفته‌ها
با وزن بدن	حرکت کول با سومو اسکات (Upright row with sumo squat)	۶ و ۲
بدون وزن بدن	فلای دمبل با کشیدن لگن به بالا (Dumbbell fly with pelvic elevation)	
باندهای الاستیک	چرخش تنه با باند الاستیک (Elastic trunk rotation)	
بدون وزن بدن	نشر نظامی با لانچ از بغل (Front raise with side lunge)	
با وزن بدن	پارویی به حالت شیب‌دار (Suspended row)	
با وزن بدن	خم شدن زانو همراه با خم شدن آرنج (Knee flexion with elbow flexion)	
با وزن بدن	خم شدن تنه به طرفین (Trunk lateral flexion)	
با وزن بدن	ایستادن روی یک پا با چشم بسته (Single leg balance with eyes closed)	
با وزن بدن	اسکات تراست (Squat thruster)	
باندهای الاستیک	فلکشن لگن با آرنج خم (Hip flexion with elbow flexion)	
با وزن بدن	کرانچ با توپ (Ball crunch)	
با وزن بدن	نشر جانب با لانچ (Side lateral raise with lunge)	
باندهای الاستیک	پارویی زیربغل (Horizontal row)	
بدون وزن بدن	ددلیفت با وزنه (Stiff leg deadlift)	
با وزن بدن	پرس نیمکت (Bench press)	
با وزن بدن	ایستادن روی یک پا با چشم بسته (Single leg balance with eyes closed)	
با وزن بدن	پرس نیمکت ایستاده (Standing bench press)	
با وزن بدن	سومو اسکات (Sumo squat)	
با وزن بدن	پارویی زیربغل (Horizontal row)	۴ و ۸
با وزن بدن	کرانچ (Crunch)	
با وزن بدن	Push forward	
با وزن بدن	اکستنشن لگن (Hips extension)	
با وزن بدن	آداکشن و آداکشن شانه (Shoulder abduction/adduction)	
با وزن بدن	چرخش تنه (Trunk rotation)	

در این پروتکل تمرینی، در همه هفته‌ها و در تمامی جلسات، زمان اجرای هر حرکت ۴۰ ثانیه و هر حرکت ۳ تکرار و استراحت‌ها به صورت ۲۰ ثانیه بین هر تکرار و ۶۰ ثانیه بین هر ایستگاه بود. پروتکل تمرین مقاومتی دایره‌ای به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه بر اساس مطالعه *Sobrero* و همکاران (۲۰۱۷) طراحی و اجرا شد [۵]. مراحل تمرین مقاومتی دایره‌ای عبارت بود از: ده دقیقه گرم کردن به صورت دویدن با شدت کم، حدود ۶۰ درصد ضربان قلب بیشینه و حرکات کششی در ابتدای جلسه، پروتکل تمرینی اختصاصی و در نهایت ده دقیقه دویدن نرم و حرکات کششی در پایان هر جلسه تمرین. پروتکل تمرین مقاومتی به صورت دایره‌ای، شامل هشت ایستگاه طراحی شد و چند روز قبل از آزمون، جلسات توجیهی برای آشنایی

مقاومتی دایره‌ای و عملکردی شدید برای شرکت‌کنندگان توضیح داده شد و همچنین با توجه به مداخله تمرینی در این پژوهش و جلوگیری از اثرات تداخلی با داروها از آزمودنی‌ها درخواست شد که در طول دوره تمرین، از مصرف هر نوع دارو به خصوص داروهای کاهش‌دهنده فشارخون، اجتناب نمایند و در صورت مصرف گزارش کنند. البته قابل ذکر است که در جریان اجرای پژوهش، تمامی آزمودنی‌ها تحت نظر پزشک متخصص کنترل شدند تا از بروز هر نوع خطرات احتمالی جلوگیری شود.

پس از آشنایی آزمودنی‌ها با مراحل اجرای کار، آنها به صورت تصادفی به سه گروه (تمرینات مقاومتی دایره‌ای، تمرینات عملکردی شدید و کنترل) تقسیم شدند. در ابتدا در مرحله پیش‌آزمون اندازه‌گیری‌های قد، وزن، اکسیژن مصرفی بیشینه، توان بی‌هوایی در ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در سالن ورزشی یکی از مراکز عملیاتی استان خوزستان سنجیده شد. پس از مرحله پیش‌آزمون، مرحله تمرینی آغاز شد. مرحله تمرینی در هشت هفته و هر هفته سه جلسه (ساعت ۸ تا ۱۰ صبح) در سالن ورزشی یکی از مراکز عملیاتی استان خوزستان انجام شد. در این مدت گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود پرداختند و گروه‌های تمرینی پروتکل‌های تمرینی طراحی شده را اجرا کردند. در طول اجرای برنامه تمرینی، اصل اضافه بار تمرین نیز با افزایش هرمی شدت و حجم تمرین کنترل شد. پروتکل تمرینی مطالعه حاضر برگرفته از تحقیق *Banaszek* و همکاران (۲۰۱۹) بود [۱۱] (جدول ۱ و ۲).

جدول ۱) مشخصه‌های اجزای تمرینات عملکردی شدید

متغیر	مشخصه
فعالیت‌های انجام شده	تمرینات مقاومتی یکپارچه، شامل تمرینات همزمان اندام فوقانی و تحتانی، حرکات چندصفحه‌ای، تمرینات ثبات مرکزی، هماهنگی حرکتی و تعادل
شدت	هفته ۱-۸: شاخص درک فشار ۶-۷ (۱۰-۵)
حجم / دوره / روش	طرح دایره‌ای با ۸ ایستگاه (تمرین)، ۴۰ ثانیه تمرین، ۲۰ ثانیه استراحت، ۳ تکرار، در مجموع ۲۵ دقیقه

جدول ۲) پروتکل‌های تمرینات عملکردی شدید

نوع ورزش	تمرین‌ها	هفته‌ها
با وزن بدن	ایستادن و نشستن با آرنج خم (Sit-to-stand with elbow flexion)	۱ و ۵
با وزن بدن	شنا (Push-ups)	
با وزن بدن	کرانچ با چرخش (Crunches with rotation)	
بدون وزن بدن	چرخش دمبل (Dumbbell swing)	
باندهای الاستیک	کشیدن به پایین با اسکات (Front pull-down with squat)	
بدون وزن بدن	حرکت فیله کمر با وزنه روی سرشانه از پشت (“Good morning”)	
با وزن بدن	باز شدن لگن همراه با بالا بردن پ (Side-lying hip abduction)	
با وزن بدن	Airplane	

($p=0/001$). در اثر تمرین عملکردی شدید، میانگین توان بی‌هوای کارکنان نظامی از پیش‌آزمون ($470/86 \pm 16/31$) تا پس‌آزمون ($525/13 \pm 14/18$) بر حسب وات افزایش معناداری داشت. همچنین تمرین مقاومتی دایره‌ای بر میانگین توان بی‌هوای کارکنان نظامی تأثیر معناداری داشت ($p=0/001$). به صورت کلی گروه‌های تمرینات عملکردی شدید و تمرینات مقاومتی دایره‌ای در مقایسه با گروه کنترل، میانگین توان بی‌هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$). دیگر نتایج حاکی از این بود که گروه تمرینات عملکردی شدید در مقایسه با گروه تمرینات مقاومتی دایره‌ای، میانگین توان بی‌هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$; جدول ۵).

در ارتباط با شاخص حداقل توان بی‌هوای، نتایج نشان داد که تمرین عملکردی شدید بر حداقل توان بی‌هوای کارکنان نظامی تأثیر معناداری داشت ($p=0/001$). در اثر تمرین عملکردی شدید، میانگین حداقل توان بی‌هوای از پیش‌آزمون ($326/73 \pm 14/34$) تا پس‌آزمون ($381/00 \pm 15/22$) بر حسب وات، افزایش معناداری داشت. همچنین تمرین مقاومتی دایره‌ای بر حداقل توان بی‌هوای کارکنان نظامی تأثیر معناداری داشت ($p=0/001$). به صورت کلی گروه‌های تمرینات عملکردی شدید و تمرینات مقاومتی، در مقایسه با گروه کنترل، حداقل توان بی‌هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$). دیگر نتایج حاکی از این بود که گروه تمرینات عملکردی شدید در مقایسه با گروه تمرینات مقاومتی دایره‌ای، حداقل توان بی‌هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$).

پیش‌آزمون ($40/60 \pm 3/48$) تا پس‌آزمون ($50/06 \pm 3/03$) به طور معناداری افزایش داشت (جدول ۵). از طرف دیگر، تمرین مقاومتی دایره‌ای نیز بر توان هوای کارکنان نظامی تأثیر معناداری داشت ($p=0/003$). به صورت کلی گروه‌های تمرینات عملکردی شدید و تمرینات مقاومتی دایره‌ای در مقایسه با گروه کنترل، توان هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$). دیگر نتایج حاکی از این بود که گروه تمرینات عملکردی شدید در مقایسه با گروه تمرینات مقاومتی دایره‌ای، توان هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$) (جدول ۵). در ارتباط با شاخص اوج توان بی‌هوای، نتایج نشان داد که تمرین عملکردی شدید بر اوج توان بی‌هوای کارکنان نظامی تأثیر معناداری داشت ($p=0/001$). در اثر تمرین عملکردی شدید، میانگین اوج توان بی‌هوای کارکنان نظامی از پیش‌آزمون ($598/73 \pm 13/23$) تا پس‌آزمون ($656/73 \pm 20/44$) بر حسب وات افزایش معناداری داشت. همچنین تمرین مقاومتی دایره‌ای بر اوج توان بی‌هوای کارکنان نظامی تأثیر معناداری داشت ($p=0/007$). به صورت کلی گروه‌های تمرینات عملکردی شدید و تمرینات مقاومتی دایره‌ای در مقایسه با گروه کنترل، اوج توان بی‌هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$). دیگر نتایج حاکی از این بود که گروه تمرینات عملکردی شدید در مقایسه با گروه تمرینات مقاومتی دایره‌ای اوج توان بی‌هوای بالاتری داشتند ($p<0/05$) (جدول ۵).

در ارتباط با شاخص میانگین توان بی‌هوای، نتایج نشان داد که تمرین عملکردی شدید بر میانگین توان بی‌هوای کارکنان نظامی تأثیر معناداری داشت

جدول ۴) میانگین سن، قد و وزن آزمودنی‌ها

گروه	تعداد	سن (سال)	قد (سانتی‌متر)	وزن (کیلوگرم)
تمرینات عملکردی شدید	۱۵	$32/80 \pm 1/89$	$182/33 \pm 3/94$	$81/06 \pm 3/47$
تمرین مقاومتی دایره‌ای	۱۵	$33/46 \pm 1/40$	$182/13 \pm 3/73$	$83/60 \pm 4/88$
کنترل	۱۵	$33/33 \pm 1/23$	$181/13 \pm 3/29$	$84/53 \pm 3/52$

جدول ۵) تغییرات بین گروهی و درون گروهی متغیرهای تحقیق

متغیر	گروه	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	تفاوت درون گروهی		تفاوت‌های بین گروهی (آزمون کوواریانس)	
				مقدار t	p	مقدار F	p
توان هوای	عملکردی شدید	$40/60 \pm 3/48$	$50/06 \pm 3/03$	-۸/۰۳	۰/۰۰۱	۳۶/۸۷	۰/۰۰۱
	مقاومتی دایره‌ای	$40/33 \pm 3/28$	$44/06 \pm 3/01$	-۳/۵۷	۰/۰۰۳		
	کنترل	$39/80 \pm 3/34$	$40/06 \pm 3/39$	-۰/۲۳	۰/۸۲۱		
اوج توان بی‌هوای	عملکردی شدید	$598/73 \pm 13/23$	$656/73 \pm 20/44$	-۱۲/۹۳	۰/۰۰۱	۳۲/۷۴	۰/۰۰۱
	مقاومتی دایره‌ای	$600/40 \pm 17/04$	$624/86 \pm 19/71$	-۳/۱۴	۰/۰۰۷		
	کنترل	$602/33 \pm 15/68$	$601/86 \pm 14/11$	۰/۰۷	۰/۹۳۹		
میانگین توان بی‌هوای	عملکردی شدید	$470/86 \pm 16/31$	$525/13 \pm 14/18$	-۱۳/۰۳	۰/۰۰۱	۳۷/۱۶	۰/۰۰۱
	مقاومتی دایره‌ای	$477/33 \pm 13/62$	$496/86 \pm 15/61$	-۴/۱۴	۰/۰۰۷		
	کنترل	$476/86 \pm 12/86$	$479/60 \pm 13/92$	-۰/۴۷	۰/۶۴۰		
حداقل توان بی‌هوای	عملکردی شدید	$326/73 \pm 14/34$	$381/00 \pm 15/22$	-۱۵/۵۱	۰/۰۰۱	۴۶/۵۲	۰/۰۰۱
	مقاومتی دایره‌ای	$322/40 \pm 16/56$	$355/40 \pm 15/11$	-۶/۰۰	۰/۰۰۱		
	کنترل	$322/40 \pm 16/94$	$327/66 \pm 14/29$	-۰/۸۵	۰/۴۰۶		

هوازی، بهبود ظرفیت بی‌هوازی و نیز بهبود استقامت نیروهای نظامی و بلاخص نیروهای عملیاتی پلیس در انواع تعقیب و گریز و سایر مأموریت‌ها شود. اجرای این نوع تمرینات، علاوه بر ایجاد ورزیدگی در صحنه مأموریت، موجب به تأخیر افتادن روند ایجاد آسیب‌های قلبی و عروقی در نیروهای با سابقه خدمت بالا و نیز بازیکنان نیروها می‌گردد. تمرینات HIFT می‌تواند بهترین روش برای ارتقای آمادگی جسمانی، هماهنگی عصبی عضلانی و چابکی برای ورود نیروهای پلیس در ماده‌های مختلف مسابقات بین‌المللی نظامی باشد.

تشکر و قدردانی: مقاله حاضر بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول است. نویسندگان از تمامی کسانی که در انجام این تحقیق همکاری کرده‌اند کمال تشکر و قدردانی را به عمل می‌آورند.

تعارض منافع: بدین‌وسیله نویسندگان مقاله تصریح می‌نمایند که هیچ‌گونه تعارض منافی در قبال مطالعه حاضر وجود ندارد.

سهام نویسندگان: محمدرضا ایزدی، احمدرضا یوسف پور و مرتضی ناجی؛ ارائه ایده و طراحی مطالعه، جمع‌آوری داده و تحلیل آماری داده؛ داریوش نصیری، تفسیر داده و جمع‌آوری داده؛ داریوش نصیری و محمدرضا ایزدی جمع‌آوری داده و تحلیل آماری داده؛ همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری آن سهم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می‌پذیرند.

Reference

1. Maleki B, Sanei S, Borhani H, Ghavami A. Effect of military training on personality traits of military students. *J Mil Med*. 2012;13(4):195-200. https://www.researchgate.net/publication/286516799_Effect_of_military_training_on_personality_traits_of_military_students
2. Shakibae A, Rahimi M, Bazgir B, Asgari A. A review on physical fitness studies in military forces. *Ebnesina*. 2015;16(4):64-79. <https://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-339-en.html>
3. Smith C, Doma K, Heilbronn B, Leicht A. Effect of exercise training programs on physical fitness domains in military personnel: A systematic review and meta-analysis. *Mil Med*. 2022;187(9-10):1065-73. <https://doi.org/10.1093/milmed/usac040>
4. Gholami M, Salehi N. The effect of eight weeks of resistance training with Dumbbell and Theraband on the body composition and muscular strength in the middle-aged Obese women: a clinical trial. *J Rafsanjan Med Sci*. 2018;17(9):829-42. <http://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.9.1.6>
5. Sobrero G, Arnett S, Schafer M, Stone W, Tolbert T, Salyer-Funk A, et al. A comparison of high intensity functional training and circuit training on health and performance variables in women: a pilot study.

یک گزینه کارآمد برای تمرین مقاومتی و دایره‌ای سنتی ارائه دهد. از محدودیت‌های تحقیق حاضر می‌توان به عدم توانایی محقق در کنترل تمامی عوامل خطرزای درونی و بیرونی آسیب و عدم کنترل دقیق تغذیه آزمودنی‌های تحقیق اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود در تحقیقات بعدی به مقایسه اثر حاد تمرینات عملکردی شدید و تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر عملکرد جسمانی و آزمون میدان موانع کارکنان نظامی پرداخته شود. همچنین اثر این دو نوع تمرین بر عوامل خطرزای قلبی، گلوکز و حساسیت به انسولین کارکنان نظامی نیز مقایسه گردد.

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج، هر دو نوع تمرین HIFT و مقاومتی دایره‌ای نسبت به گروه کنترل، موجب افزایش توان هوازی، بهبود ظرفیت بی‌هوازی و نیز بهبود استقامت کارکنان نظامی می‌شود. از نتایج مطالعه حاضر می‌توان دریافت تمرینات HIFT در مقایسه با تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر عملکرد جسمانی و توان رزم کارکنان نظامی احتمالاً مؤثرتر است و به مربیان نظامی پیشنهاد می‌گردد که با توجه به شرایط زمانی، از تمرینات عملکردی شدید در مقایسه با تمرینات مقاومتی دایره‌ای در جهت بهبود توان هوازی و توان بی‌هوازی کارکنان نظامی استفاده کنند.

نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی: اجرای تمرینات HIFT و مقاومتی دایره‌ای می‌تواند موجب افزایش توان

- Women Sport Phys Acti J. 2017;25(1):1-30. <http://dx.doi.org/10.1123/wspaj.2015-0035>
6. Trapp EG, Chisholm DJ, Freund J, Boutcher SH. The effects of high-intensity intermittent exercise training on fat loss and fasting insulin levels of young women. *Int J obes*. 2008;32(4):684-91. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803781>
7. Chtara M, Chaouachi A, Levin GT, Chaouachi M, Chamari K, Amri M, et al. Effect of concurrent endurance and circuit resistance training sequence on muscular strength and power development. *J Strength Cond Res*. 2008;22(4):1037-45. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31816a4419>
8. Feito Y, Hoffstetter W, Serafini P, Mangine G. Changes in body composition, bone metabolism, strength, and skill-specific performance resulting from 16-weeks of HIFT. *PLoS one*. 2018;13(6):e0198324. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198324>
9. Heinrich KM, Spencer V, Fehl N, Carlos Poston WS. Mission essential fitness: comparison of functional circuit training to traditional Army physical training for active duty military. *Mil Med*. 2012;177(10):1125-30. <https://doi.org/10.7205/milmed-d-12-00143>
10. Claudino JG, Gabbett TJ, Bourgeois F, Souza HdS,

