

## Comparison of Brain-Behavioral Systems (BAS/BIS) in Drug-Dependent and Normal Individuals\*

Received: 17 April 2014

Revised: 23 June 2014

Accepted: 29 June 2014

### ABSTRACT

Asadollah Maleki Gamchi<sup>1</sup>  
Ali Khademi<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>MA, Psychology, Department of Psychology, West Azarbaijan, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

<sup>2</sup>Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran.

### \*Corresponding Author:

Ali Khademi  
Tel: (+98)9143208933

e-mail: dr\_ali\_khademi@yahoo.com

**Background:** One of the most important approaches is the sensitivity theory to strengthening with hypothesis of behavioral inhibition and activation systems in addiction and abuse of drugs upon which this research is based on. The purpose of this research is to study the differences between brain-behavioral systems in drug-dependent and normal individuals.

**Materials and Methods:** This is a casual-comparative study. The population of this study consists of all Urmia resident men and women aging from 20 to 50 years who were settled in addiction relief camps in October 2013. 120 testing addicted (80 men and 40 women) and 120 testing normal individuals (80 men and 40 women) whose age, gender and educations were similar to the addicted group were chosen by randomly sampling method. Measuring instrument of this research was Carver White's questionnaire (1994) and the data was analyzed and compared by using dual-sample independent T testing method.

**Results:** The findings demonstrated that level of behavioral activation system in the addiction is higher than in normal individuals group and the level of behavioral inhibition system in normal individuals is higher than in addicted. Also, the findings expressed that behavioral activation system in men was more active than women and behavioral inhibition system in women is more active than men but was not observed significant difference in behavioral activation system between addicted men and women.

**Conclusion:** The findings were parallel with Gray Reinforcement Sensitivity Theory (1993) on the fact that consuming the drugs is caused by further activity of behavioural activation system.

**Keywords:** brain-behavioral systems, behavioral activation system, behavioral inhibition system, addiction

\*This article has been extracted from first author's MA thesis.

## مقایسه سیستم‌های مغزی - رفتاری (BAS/BIS) در افراد وابسته به مواد و

## بهنجار\*

تاریخ دریافت: ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ تاریخ اصلاح: ۲ تیر ۱۳۹۳ تاریخ پذیرش: ۸ تیر ۱۳۹۳

**مقدمه:** از مهم‌ترین رویکردها در زمینه‌ی سوءمصرف مواد، تئوری حساسیت به تقویت‌گری با فرضیه‌های سیستم فعال‌ساز و بازداری رفتاری است که پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تفاوت سیستم‌های مغزی - رفتاری در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار بر مبنای آن شکل گرفته است.

**مواد و روش‌ها:** تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان و مردان معتاد ۲۰ تا ۵۰ ساله ساکن شهر ارومیه در آبان ماه سال ۱۳۹۲ در کمپ‌های ترک اعتیاد می‌باشند. ۱۲۰ آزمودنی معتاد (۸۰ نفر مرد، ۴۰ نفر زن) و ۱۲۰ آزمودنی بهنجار (۸۰ نفر مرد، ۴۰ نفر زن) که از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه معتاد هم‌تا شده بودند با روش نمونه‌گیری نسبتی تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کارور و وایت (۱۹۹۴) بوده و داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** یافته‌ها نشان داد تفاوت معنی‌داری در سیستم‌های مغزی - رفتاری افراد معتاد و غیر معتاد وجود دارد به طوری که سطح سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS) در افراد معتاد بالاتر از افراد غیر معتاد و سطح سیستم بازداری رفتاری (BIS) در افراد غیر معتاد بالاتر از افراد معتاد است. همچنین یافته‌ها بیانگر آن بود که سیستم فعال‌ساز رفتاری در مردان فعال‌تر از زنان و سیستم بازداری رفتاری در زنان فعال‌تر از مردان بوده است. ولی در سیستم فعال‌ساز رفتاری در مردان و زنان معتاد تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است.

**نتیجه‌گیری:** یافته‌ها با تئوری حساسیت به تقویت‌گری (۱۹۹۳) مبنی بر این که مصرف مواد از فعالیت بیشتر سیستم فعال‌ساز رفتاری ناشی می‌شود همسو بوده است.

**کلید واژه‌ها:** سیستم‌های مغزی - رفتاری، سیستم فعال‌ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، اعتیاد

\* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول است.

## چکیده

اسداله مالکی گمچی<sup>۱</sup>  
علی خادمی<sup>۲\*</sup>

<sup>۱</sup> کارشناس ارشد، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی، گروه روانشناسی، ارومیه، ایران.  
<sup>۲</sup> استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، گروه روان‌شناسی، ارومیه، ایران.

## \* نویسنده مسئول:

علی خادمی  
تلفن: ۰۸۹۳۳۰۸۹۳۳ (۹۸+)  
پست الکترونیک:  
dr\_ali\_khademi@yahoo.com

## مقدمه

باعث انحراف در عملکرد سیستم پاداش‌دهی مغز<sup>۱</sup> می‌شود. چنین انحرافات در بافت‌های مغزی، انتقال‌دهنده‌های عصبی و سطوح ناحیه‌ای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر می‌شود که هم در نمونه حیوانی و هم در انسان به اثبات رسیده است. لذا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که تلاش می‌کنند این موضوع را توضیح دهند [۲ و ۱]. بر اساس نظریه پاولف شخصیت مبتنی بر عملکرد دستگاه عصبی است و دو فرآیند اساسی که بر

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی و اجتماعی قرن حاضر، از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری جامعه بشری و یکی از ناگوارترین آسیب‌های اجتماعی است. چندین دهه تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که مصرف مواد مخدر، کارکرد قشر پاداش‌دهی مغز را مورد آسیب قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر

واکنشی در یکی از این سیستم‌ها می‌داند. طبق این نظریه، شخصیت سالم در یک پیوستار با آسیب روانی قرار دارد؛ بنابراین قطبیت گرایي در هر یک از این متغیرها، به‌عنوان عامل خطر افزایش آسیب روانی در نظر گرفته شده است [۱۱].

در زمینه‌ی اعتیاد بیشترین توجه به فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری معطوف است و بیشترین یافته‌ها در مورد فعالیت این سیستم در انسان، از مطالعات مربوط به انتقال‌دهنده عصبی دوپامین<sup>۷</sup> نشأت می‌گیرد. آزادسازی دوپامین در مسیرهای دوپامینرژیک مرتبط با سیستم فعال ساز رفتاری با جریان یافتن برنامه‌های حرکتی این سیستم همراه است [۱۲]. پایه‌های کالبدشناسی عصبی این سیستم که از لحاظ ساختاری با مسیر مغزی دوپامینرژیک و مدارهای کورتیکو استریتوپالیدو تالامیک<sup>۸</sup> (CSPT) مرتبط می‌باشد [۱۳]. گری عقیده دارد که رها کردن دوپامین در هسته‌ی اکومبینس<sup>۹</sup>، ارتباط تنگاتنگی با هیجان بالا دارد که در مصرف‌کنندگان الکل و مواد مخدر مشاهده شده است. این موضوع، می‌تواند تفسیر اغراق‌آمیز از لذتی باشد که در شکل‌های مرسوم تقویت به دست می‌آید، موضوعی که به‌شدت توسط افراد با سطوح بالای BAS دنبال می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، افراد با حساسیت بالا در BAS مستعد رفتار گرایشی و تجربه‌ی مثبت موقعیت‌هایی است که در آن، محرک با پاداش همراه می‌شود [۱۴].

نظریه گری یکی از مؤثرترین نظریه‌های زیست‌شناختی در زمینه‌ی شخصیت است که موجب تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیولوژی اعصاب شده است [۱۶ و ۱۵]. تبیین گری از شخصیت که مبنای هیجانی روشنی دارد و ساختارهای زیستی-عصبی شخصیت را آشکار ساخته، مورد توجه قرار گرفته است. وی عنوان می‌کند که گرایش به انواع خاصی از هیجانانگیز به دلیل تفاوت در سیستم‌های مغزی رفتاری است و مدل وی بیان می‌دارد که ساختارهای مختلف مغز، سیستم‌های انگیزش اساسی را که در تعامل با تقویت رفتاری هستند، راه‌اندازی می‌نماید [۱۷]. به اعتقاد گری این سیستم مغزی رفتاری اساس تفاوت‌های فردی هست و فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی واکنش هیجانی متفاوت نظیر زود انگیزختگی، اضطراب و ترس می‌انجامد [۱۹ و ۱۸]. حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری، نشان‌دهنده‌ی تکانش‌گری<sup>۱۰</sup> فرد هست [۲۱ و ۲۰]. از سوی دیگر این نکته نیز تأیید شده است که مصرف داروهایی چون هروئین، کوکائین، آمفتامین الکل و نیکوتین موجب آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی یادشده می‌شود [۲۲]. پس شگفت‌انگیز نیست که پیشنهاد شده حساسیت بالای BAS در آسیب‌شناسی اختلال‌های روانی همچون سو مصرف الکل و مواد مخدر نقش دارد [۲۴ و ۲۳]. به دنبال ارائه نظریه گری، پژوهشگران مختلف این فرضیه را مطرح

تمامی فعالیت‌ها حاکم است، برانگیختگی و بازداری است. تمامی محرک‌های درونی و بیرونی که باعث برانگیختگی و بازداری می‌شوند، هر چه بیشتر تکرار شوند در مغز ثبات بیشتری یافته و در نهایت رفتارهای قالبی پویایی را پدید می‌آورد که مقاومت زیادی دارد. آنچه در دیدگاه پاولف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توان میان فرآیندهای تحریکی و بازدارنده است [۳]. پس از پاولف، آیزنک (۱۹۹۰) توجه ویژه‌ای به فعال‌سازی مغزی داشت؛ وی یک الگوی شخصیت و انگیزش دوبعدی بر پایه عصب روان‌شناختی پیشنهاد کرد و با طرح ویژگی‌هایی نظیر درون‌گرایی و برون‌گرایی، به‌عنوان عوامل اصلی شخصیت تلاش نمود تا برای هر یک از این ویژگی‌ها ساختار و عملکرد زیستی معینی را معرفی نماید و بیان کرد که روان رنجوری با هیجان ناخوشایند و برون‌گرایی با هیجان خوشایند ارتباط مستقیم دارد [۴]. در ادامه، جفری گری<sup>۱</sup>، کارهای پاولف و آیزنک را ادامه داد و نظریه عصب روان‌شناختی خود را به‌عنوان نظریه «حساسیت به تقویت»<sup>۲</sup> مطرح کرد [۵ و ۳].

تئوری حساسیت به تقویت گری (۱۹۹۳) وجود دو سیستم فعال‌کننده رفتاری<sup>۳</sup> (BAS) و بازدارنده رفتاری<sup>۴</sup> (BIS) را مطرح می‌کند [۶]. گری دو سیستم انگیزشی عصبی را مطرح کرد که شدت رفتار گرایشی و اجتنابی را در پاسخ به محرک‌های محیطی تنظیم می‌کند. فرض می‌شود که BAS رفتارگرایشی را در پاسخ به نشانه‌های پاداش یا فعالیت دوپامینرژیک در سیستم مزولمبیک کنترل می‌کند [۷] درحالی‌که BIS به نشانه‌های تنبیه و تهدید، پاسخ‌های بازداری و اجتنابی یا فعالیت سروتونرژیک و نوروآدرنرژیک در سیستم سیتوهیبوکامپ حساس است [۸ و ۷]. اولین سیستم، سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS) هست که به محرک‌های شرطی پاداش و فقدان تنبیه پاسخ می‌دهد. فعالیت افزایش حساسیت این سیستم موجب فراخوانی هیجان‌های مثبت، رفتار روی‌آورد<sup>۵</sup> و اجتناب فعال<sup>۶</sup> می‌گردد. دومین سیستم، سیستم بازداری رفتاری (BIS) است که به محرک‌های شرطی تنبیه و فقدان پاداش و همچنین به محرک‌های ترس‌آور ذاتی پاسخ می‌دهد [۹ و ۱۰].

تئوری حساسیت به تقویت گری، یک تئوری زیست‌محور است که بیان می‌کند، تفاوت‌های شخصیتی افراد ریشه در تفاوت سیستم پاداش افراد دارد. سیستم بازداری رفتاری به نشانه‌های تنبیه حساس هست و به‌عنوان عاملی برای هشدار به فرد برای توجه به احتمال خطر و تنبیه عمل می‌کند. سیستم فعال‌ساز رفتاری که به نشانه‌های پاداش حساس هست، فرد را به سمت رفتار سوق می‌دهد. تفاوت‌های فردی در سیستم‌های فعال‌ساز و بازدارنده رفتاری نشانگر ابعاد اساسی شخصیتی هستند. گری اختلالات را بازتاب بیش یا کم

کرده‌اند که نارساکنش‌وری سیستم‌های مغزی - رفتاری موجب اختلال‌های روان‌پزشکی می‌شود [۲۶ و ۲۵].

گری (۱۹۹۱؛ ۱۹۹۴) دریافت که مصرف مواد، ناشی از فعالیت بیشتر سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS) است. لاکستون<sup>۱</sup> و داو<sup>۲</sup> [۲۷] نیز دریافتند که نمره‌های پایین BIS و نمره‌های بالای BAS هردو با سوءمصرف الکل مرتبط است.

رابطه‌ی مثبت سوءمصرف مواد با فعالیت بالای سیستم فعال‌ساز رفتاری و رابطه منفی سوءمصرف مواد با سیستم بازداری رفتاری در تحقیقات فرانکن<sup>۳</sup> و موریس<sup>۴</sup> [۲۴] هانت<sup>۵</sup> و همکاران [۲۸] کیمبرل<sup>۶</sup> و نلسون<sup>۷</sup> [۲۹] سیمونس<sup>۸</sup> و همکاران [۳۰] نشان داده شده است. جانسون<sup>۹</sup> و همکاران [۳۱] در تحقیق خود رابطه قوی بین اعتیاد به مواد مخدر و جستجوی لذت را به اثبات رسانده‌اند. فاولز<sup>۱۰</sup> [۳۳] و [۳۲] مطرح می‌کند که سوءمصرف مواد نتیجه غلبه سیستم فعال‌ساز رفتاری بر سیستم بازدارنده رفتاری هست این رابطه به وسیله مطالعات مختلفی تأیید شده است. جانسون و همکاران [۳۱] در تحقیق خود نشان دادند که نمره‌های BAS بالا پیش‌بینی‌کننده سوءمصرف مواد و وابستگی به آن هست؛ بنابراین پیش‌بینی بر این است که افرادی در معرض بیشترین خطر مشکلات مواد و الکل قرار دارند که فعالیت سیستم فعال‌ساز رفتاری آنان بالاتر از سطح فعالیت این سیستم در افراد عادی و فعالیت سیستم بازدارنده آنان پایین‌تر از سطح فعالیت این سیستم در افراد عادی می‌باشد [۳۴]. تحقیق هسکینگ<sup>۱۱</sup> [۳۵] یکی از محدود مطالعاتی است که میان سیستم فعال‌ساز رفتاری و سوءمصرف مواد رابطه‌ای نیافته است. از طرفی لاکستون و داو [۳۶] لاکستون و همکاران [۳۷] رابطه معنی‌داری بین سیستم بازداری و سوءمصرف مواد نیافته‌اند.

پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با تفاوت جنسیتی در سیستم‌های مغزی/ رفتاری نیز نشان می‌دهد که زنان نمرات بالاتری در مقیاس بازداری می‌گیرند و تفاوت معنی‌داری در مقیاس فعال‌ساز رفتاری آن‌ها مشاهده نمی‌شود [۳۸]. در مقابل دسته‌ای از مطالعات تفاوتی در فعالیت سیستم‌های مغزی - رفتاری دو جنس نشان داده نشده است [۴۰ و ۳۹].

یافته‌های متناقض و متفاوت در پژوهش‌های متعدد در این زمینه و نظر به تبیین دامنه وسیعی از رفتارهای انسان با سیستم مغزی و رفتاری و همچنین اهمیت این موضوع از نظر اقدامات تشخیصی و درمانی، لزوم و ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان می‌کند. هدف پژوهش حاضر مقایسه سطوح BAS و BIS در افراد عادی و معتاد هست لذا برای دستیابی به اهداف پژوهش ۴ فرضیه زیر تدوین و مورد بررسی قرار گرفتند. ۱- سطح BAS و BIS در افراد معتاد و غیر معتاد تفاوت دارد ۲- سطح BAS و BIS با توجه به

جنسیت تفاوت دارد ۳- سطح BAS و BIS در مردان و زنان معتاد تفاوت دارد ۴- سطح BAS و BIS در مردان و زنان غیر معتاد تفاوت دارد.

### مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر یک پژوهش علی مقایسه‌ای است که در آن چهار گروه آزمودنی شامل مردان و زنان معتاد و غیر معتاد مورد مطالعه قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان و مردان معتاد بین ۲۰ تا ۵۰ ساله است که در آبان ماه سال ۱۳۹۲ در کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان ارومیه به سر می‌بردند. از میان این افراد کسانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند تست اعتیاد گرفته شد سپس یک دکتر روان‌شناس با زنان و مردان که تست آن‌ها مثبت بود مصاحبه تشخیصی انجام داد. ملاک‌های ورود به پژوهش دارا بودن ملاک‌های تشخیصی DSM-IV برای وابستگی به مواد با اختلال محور یک و دو DSM-IV بود. از این جامعه آماری ۱۲۰ نفر به روش نمونه‌گیری نسبتی تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند حجم نمونه مورد مطالعه شامل ۱۲۰ نفر (۸۰ نفر مرد، ۴۰ نفر زن) وابسته به مواد و گروه کنترل نیز ۱۲۰ نفر (۸۰ نفر مرد، ۴۰ نفر زن) غیر معتاد بدون سابقه مصرف مواد که از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه معتاد هم‌تا شده بودند می‌باشد.

ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه سیستم‌های مغزی - رفتاری (BAS-BIS) است. این ابزار به وسیله کارور و وایت (۱۹۸۴) جهت اندازه‌گیری حساسیت سیستم‌های رویکردی و اجتنابی (RST) افراد طراحی شده است. پرسشنامه سیستم‌های فعال‌ساز و بازداری رفتاری، از ۲۴ گویه تشکیل شده است که دو سیستم فعال‌ساز و بازداری را اندازه‌گیری می‌نماید. سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS) دارای سه مؤلفه هست. مؤلفه‌ی سائق (basd)، تمایل فرد را به تعقیب فعالانه‌ی اهداف مطلوب اندازه می‌گیرد و شامل ۴ گویه است. به‌عنوان مثال عبارت «وقتی چیزی را می‌خواهم، همیشه با تمام وجود به دنبال آن می‌روم» یکی از گویه‌های این مؤلفه است. مؤلفه‌ی طلب هیجان و سرگرمی (basf)، تمایل فرد به تعقیب فعالانه‌ی سرگرمی و هیجان را اندازه می‌گیرد و شامل ۴ گویه هست؛ به‌عنوان مثال عبارت «گاهی کارهایی انجام می‌دهم که ممکن است دلیلی به جز سرگرمی نداشته باشند» یکی از گویه‌های این مؤلفه است. مؤلفه‌ی پاسخ‌دهی به پاداش (basf)، درجه‌ای را که پاداش‌ها به هیجان‌های مثبت منجر می‌شوند و تمایل به روی آوردن به رویدادهای بالقوه‌ی پاداش‌دهنده در تحریک لحظه‌ای را اندازه می‌گیرد و شامل ۵ گویه هست. عبارت «وقتی از انجام دادن کاری لذت می‌برم، دوست دارم آن را ادامه دهم» یکی از گویه‌های این مؤلفه است. حساسیت سیستم بازداری رفتاری (BIS)،

جدول ۱: مقایسه سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های آن‌ها در افراد معتاد و غیر معتاد

P	df	T	انحراف معیار	میانگین	گروه	
.001	238	3/21	2/22	8/25	معتاد	سائق (basd)
			2/22	7/33	غیر معتاد	
.002	238	3/20	2/47	8/80	معتاد	طلب هیجان و سرگرمی (basf)
			1/59	7/87	غیر معتاد	
.000	238	4/05	2/02	7/86	معتاد	پاسخ‌دهی به پاداش (basr)
			1/70	6/88	غیر معتاد	
.000	238	5/62	1/33	8/27	معتاد	سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS)
			1/25	7/33	غیر معتاد	
.008	238	-2/66	1/37	11/05	معتاد	سیستم بازداری رفتاری (BIS)
			1/30	11/51	غیر معتاد	

آلفای کرونباخ برای سیستم بازداری رفتاری ۰/۶۹ و برای سائق ۰/۸۷، پاسخ‌دهی پاداش ۰/۷۴ و برای جستجوگری ۰/۶۵ و برای کل سیستم فعال‌ساز رفتاری ۰/۷۸ گزارش شده است. موسوی و همکاران [۴۳] ثبات درونی سیستم بازداری رفتاری را برابر با آلفای ۰/۷۶ و سیستم فعال‌ساز رفتاری را ۰/۸۷ و نتایج همبستگی آزمون- پس‌آزمون با فاصله سه هفته برای سیستم بازداری رفتاری ۰/۹۱ و برای سیستم فعال‌ساز رفتاری ۰/۸۹ به‌دست‌آمده است.

#### یافته‌ها

مقایسه و اطلاعات مربوط به میانگین، انحراف معیار و سطح معنی‌داری سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های هر چهار گروه از مردان و زنان معتاد و غیرمعتاد در جداول ۱، ۲، ۳ و ۴ نشان داده شده است.

جدول ۱ نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری در سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های آن‌ها در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد. به‌طوری‌که سطح سیستم فعال‌ساز رفتاری افراد معتاد و زیر مقیاس‌های آن‌ها در مقایسه با افراد غیرمعتاد بالاتر می‌باشد. از

پاسخ‌دهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه‌های تهدید را اندازه می‌گیرد و شامل ۷ گویه هست. عبارت «اگر فکر کنم حوادث ناگواری در حال روی دادن است، معمولاً بسیار عصبانی می‌شوم» یکی از گویه‌های این مؤلفه است. ۴ گویه اضافی به‌عنوان گویه‌های پوششی در مقیاس آورده شده‌اند که در اندازه‌گیری و ارزیابی نقشی ندارند [۴۱]. «اغلب تعجب می‌کنم که چرا مردم خیلی زیاد کار می‌کنند» یکی از گویه‌های پوششی است. برای سنجش نرمال بودن داده‌ها از آزمون کالموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون آماری t مستقل دو نمونه‌ای استفاده شده است و در تحلیل فرضیه‌های پژوهش  $P < 0.05$  معنی‌دار تلقی می‌شود.

سؤالات این مقیاس به‌صورت ۴ درجه‌ای و بر اساس مقیاس لیکرت نمره‌گذاری می‌شود. به گزارش کارور و وایت پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای سیستم بازداری رفتاری برابر ۰/۷۴ و برای زیر مؤلفه‌های سیستم فعال‌ساز رفتاری، یعنی پاسخ‌دهی به پاداش، سائق و جستجوی هیجان و سرگرمی به ترتیب برابر با ۰/۷۳، ۰/۷۶ و ۰/۶۶ است [۳۸]. در پژوهش محمدی [۴۲] نیز

جدول ۲: مقایسه سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های آن‌ها با توجه به جنسیت

P	df	T	انحراف معیار	میانگین	تعداد	گروه	
.002	238	-3/11	2/16	7/16	80	زن	سائق (basd)
			2/25	7/11	160	مرد	
.001	238	-3/62	1/84	7/66	80	زن	طلب هیجان و سرگرمی (basf)
			2/40	8/67	160	مرد	
.000	238	-3/77	1/89	6/73	80	زن	پاسخ‌دهی به پاداش (basr)
			1/87	7/70	160	مرد	
.000	238	-5/51	1/35	7/15	80	زن	سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS)
			1/26	8/13	160	مرد	
.000	238	3/93	1/43	11/75	80	زن	سیستم بازداری رفتاری (BIS)
			1/25	11/04	160	مرد	

جدول ۳: مقایسه سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های آن بین زنان معتاد و مردان معتاد

P	df	T	انحراف معیار	میانگین	تعداد	گروه	
۰/۱۱۱	۱۱۸	-۱/۵۹	۲/۲۴	۷/۸۰	۴۰	زن معتاد	سائق (basd)
			۲/۱۹	۸/۴۸	۸۰	مرد معتاد	
۰/۳۹۴	۱۱۸	-۰/۸۵	۱/۴۶	۸/۵۷	۴۰	زن معتاد	طلب هیجان و سرگرمی (basf)
			۲/۸۵	۸/۹۱	۸۰	مرد معتاد	
۰/۷۴۱	۱۱۸	-۰/۳۳	۱/۹۰	۷/۷۸	۴۰	زن معتاد	پاسخ‌دهی به پاداش (basr)
			۲/۰۸	۷/۹۱	۸۰	مرد معتاد	
۰/۱۶۰	۱۱۸	-۱/۴۱	۱/۱۲	۸/۰۳	۴۰	زن معتاد	سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS)
			۱/۴۲	۸/۳۹	۸۰	مرد معتاد	
۰/۰۰۴	۱۱۸	۲/۹۳	۱/۴۸	۱۱/۵۵	۴۰	زن معتاد	سیستم بازداری رفتاری (BIS)
			۱/۲۴	۱۰/۷۹	۸۰	مرد معتاد	

دارد، به طوری که سطح سیستم فعال‌ساز رفتاری مردان غیرمعتاد و زیر مقیاس‌های آن‌ها در مقایسه با زنان غیرمعتاد بالاتر می‌باشد. از طرفی سطح سیستم بازداری رفتاری زنان غیرمعتاد در مقایسه با مردان غیرمعتاد بالاتر است.

#### بحث و نتیجه‌گیری

سازمان بهداشت جهانی و انجمن روان‌پزشکی آمریکا، اعتیاد را به‌عنوان یک بیماری مزمن همراه با تمایل شدید به مصرف مواد و مشکلات وابسته به آن تعریف کرده‌اند. اعتیاد به مواد مخدر بیماری روانی عودکننده و مزمنی است که توأم با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می‌شود. میلیون‌ها انسان از این اختلال رنج می‌برند که اغلب با دیگر بیماری‌های روانی بروز و ظهور یافته و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را بر جامعه تحمیل می‌کند [۴۸ و ۴۷].

طرفی سطح سیستم بازداری رفتاری افراد معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتاد پایین‌تر است.

جدول ۲ بیانگر آن است که تفاوت معنی‌داری در سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های آن‌ها با توجه به جنسیت وجود دارد. به طوری که سطح سیستم بازداری رفتاری در زنان در مقایسه با مردان بالاتر است و سطح سیستم فعال‌ساز رفتاری در مردان در مقایسه با زنان بالاتر است.

جدول ۳ نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری در سیستم فعال‌ساز رفتاری در بین زنان و مردان معتاد مشاهده نمی‌شود ولی در سیستم بازداری رفتاری تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود دارد و سطح آن در زنان معتاد بالاتر از مردان معتاد هست.

جدول ۴ نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری در سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های آن‌ها در مردان و زنان غیرمعتاد وجود

جدول ۴: مقایسه سیستم‌های مغزی- رفتاری و زیر مقیاس‌های آن بین زنان غیرمعتاد و مردان غیرمعتاد

P	df	T	انحراف معیار	میانگین	تعداد	گروه	
۰/۰۰۴	۱۱۸	-۲/۰۹	۱/۹۰	۷/۵۲	۴۰	زن غیرمعتاد	سائق (basd)
			۲/۲۷	۷/۷۳	۸۰	مرد غیرمعتاد	
۰/۰۰۰	۱۱۸	-۴/۸۷	۱/۷۳	۶/۷۵	۴۰	زن غیرمعتاد	طلب هیجان و سرگرمی (basf)
			۱/۸۱	۸/۴۴	۸۰	مرد غیرمعتاد	
۰/۰۰۰	۱۱۸	-۶/۳۱	۱/۱۵	۵/۶۸	۴۰	زن غیرمعتاد	پاسخ‌دهی به پاداش (basr)
			۱/۶۱	۷/۴۹	۸۰	مرد غیرمعتاد	
۰/۰۰۰	۱۱۸	-۸/۲۴	۰/۹۲	۶/۲۶	۴۰	زن غیرمعتاد	سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS)
			۱/۰۳	۷/۸۶	۸۰	مرد غیرمعتاد	
۰/۰۰۸	۱۱۸	-۲/۶۹	۱/۳۷	۱۱/۵۹	۴۰	زن غیرمعتاد	سیستم بازداری رفتاری (BIS)
			۱/۲۲	۱۱/۲۹	۸۰	مرد غیرمعتاد	

است [۵۹] و توسط محرک‌های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال می‌شود. حساسیت این سیستم نمایانگر زود انگیزشی است [۱۳] و به نظر می‌رسد که برای تجاربی نظیر امید، وجد و شادی پاسخگو باشد [۱۹]. سیستم بازداری رفتاری حاصل فعالیت مسیرهای آوران، نورو آدرنژیک و سروتونژیک است. نوروناتومی آن در سیستم جداری-هیپوکامپی ساقه‌ی مغز، مدار پایز و کرتکس حدق‌های-پیشانی قرار دارد. این ساختارها موجب افزایش برانگیختگی و سطوح توجه و تجربه‌ی عواطف منفی می‌شوند [۵] و با نظام‌هایی که اضطراب در آن نقش دارند، همپوشی دارد. در نتیجه، حساسیت این سیستم با اضطراب، نگرانی و نشخوار فکری مطابقت دارد [۶۰]. بنابراین به نظر می‌رسد آزادسازی دوپامین با فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری ارتباط دارد. با فعالیت این سیستم و ترشح هورمون دوپامین حساسیت فرد بالا می‌رود و به دریافت پاداش بالقوه حساس می‌شود و برای جستجوی این پاداش‌ها انگیزش پیدا می‌کند و درصدد است تا به هر طریقی که شده پاداش دریافت کند و به محض دریافت پاداش تقویت صورت می‌گیرد و از طرفی مصرف مواد هم منجر به آزاد شدن دوپامین می‌شود و چرخه فوق مجدداً تکرار می‌گردد. در رابطه با سیستم فعال ساز رفتاری نیز به نظر می‌رسد این سیستم می‌تواند فرآیندهای فیزیولوژیکی و کنش‌های قشر عالی را راه‌اندازی کرده و در واکنش‌های عاطفی و شناختی به چالش‌های محیطی نقش داشته باشد این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک عامل حمایتی فرد را در اجتناب و گریز از موقعیت‌های خطرناک به‌خصوص مصرف مواد دور نگه دارد. چنین استنباط می‌شود که سیستم فعال ساز رفتاری نشان‌دهنده عوامل زیستی زمینه‌ساز اعتیاد در افراد مستعد اعتیاد بوده و سیستم بازداری رفتاری نیز از عوامل زیستی اجتناب از اعتیاد محسوب می‌گردد.

در تبیین بعدی طبق نظریه حساسیت به تقویت گری، می‌توان گفت که سیستم فعال‌سازی رفتاری به‌عنوان برانگیزاننده رفتاری برای دستیابی به خواهش‌ها و پاداش‌ها، عمل می‌کند. فعالیت بیش از حد این سیستم به رفتار تکانشی می‌انجامد. فرد کارهایی را انجام می‌دهد که احتمالاً به دریافت پاداش منجر می‌شود بدون آن‌که توجه زیادی به احتمال پیامدهای منفی داشته باشد. سیستم فعال‌سازی رفتاری به‌عنوان یک سیستم انگیزشی ترغیب‌کننده، موجب برانگیختن رفتار در پاسخ به محرک‌های پاداش می‌گردد. فعالیت سیستم فعال‌سازی- رفتاری، رفتارهایی را ترغیب می‌کند که هنگام دریافت پاداش، انگیزش و فعالیت را کاهش می‌دهد. در مقابل سیستم بازداری رفتاری به‌عنوان فرایندی جهت اعلام‌خطر به‌احتمال تنبیه و پیامدهای ناخوشایند ناشی از انجام کاری عمل می‌کند.

نظریه حساسیت به تقویت، شخصیت بهنجار و نابهنجار در امتداد یک پیوستار قرار دارد؛ بنابراین افرادی که در قطب انتهایی ابعاد سیستم فعال‌ساز رفتاری و سیستم بازداری قرار می‌گیرند، با احتمال بیشتری در معرض توسعه علائم آسیب‌شناختی قرار دارد [۴۹]. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که سطح سیستم فعال‌ساز رفتاری در افراد معتاد نسبت به افراد غیرمعتاد بالاتر بوده و فعالیت بیشتری دارد و سطح سیستم بازداری افراد معتاد نسبت به افراد غیرمعتاد پایین‌تر است. این یافته با تحقیقات فرانکن، موریس، و گیورگیا [۲۳] جانسون، ترنر و ایوانا [۳۱] لاکستون و داو [۲۷] فرانکن و موریس [۲۴] هانت، کیمبرل، گری‌رو، میشل و نلسون [۲۸] کیمبرل، نلسون، گری‌رو و مشیل [۲۹] سیمونس، دیووراک و باتین [۳۰] جانسون، ترنر و لواتا [۳۱]. اینگمار و موریس [۴۷] فاولز [۳۳ و ۳۲] فهیمی و همکاران [۴۸] عبدالله زاده جدی [۴۹] علی مرادی و همکاران [۵۰] همسو است. یافته‌های دیگر تحقیق نشان داد سطح سیستم فعال‌ساز و بازداری رفتاری با توجه به جنسیت معنی‌دار بوده و سطح سیستم بازداری در زنان فعالیت بیشتری نسبت به مردان دارد. این یافته با نتایج تحقیقات صبوری مقدم و همکاران [۵۱] نبی زاده چپانه [۵۲] سپاه منصور [۳] شاهنده و همکاران [۵۳] لئون، پرکیتی، باگوزی، پیرووماتی [۵۴] جرم و همکاران [۵۵] هماهنگ و همسو است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در سیستم فعال‌ساز رفتاری زنان و مردان تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود ولی در سیستم بازداری رفتاری تفاوت معنی‌داری وجود دارد و سطح آن در زنان معتاد بالاتر از مردان معتاد است. در تبیین این یافته هم می‌توان به نتایج تحقیقات محسنی کلوری، حق شناس و اسدی [۵۶] باباپور خیرالدین، داداش زاده، طوسی [۵۷] اشاره کرد که با نتایج تحقیق هماهنگی دارد. نتایج دیگر حاکی بود که تفاوت معنی‌داری در سیستم فعال‌ساز و بازداری رفتاری در مردان و زنان غیرمعتاد وجود دارد. به‌طوری که سطح سیستم فعال‌ساز رفتاری مردان غیرمعتاد بالاتر از زنان غیرمعتاد و سطح سیستم بازداری رفتاری زنان غیرمعتاد بالاتر از مردان غیرمعتاد بوده است. این یافته نیز با نتایج پژوهش‌های لئون و همکاران [۵۴] نیومن و همکاران [۵۸] هماهنگی دارد. فعال بودن سیستم بازداری در زنان در مقایسه با مردان نیز با تحقیقات لئون و همکاران [۵۴] جرم و همکاران [۵۵] همسو است. در تبیین یافته‌های پژوهش می‌توان به دیدگاه عصب زیست شناختی و زیربنای زیستی و نورولوژیکی اشاره کرد. سیستم فعال‌ساز رفتاری به لحاظ ساختاری شامل چندین مسیر دوپامینرژیک و مدارهای کورتیکو-استریو-پالیدو-تالامیک در مغز است. نوروناتومی این سیستم، کورتکس پیشانی، بادامه و عقده‌های پایه

داده می‌شود که زنان دیرتر از مردان به سمت مواد مخدر ترغیب شوند. از طرفی به نظر می‌رسد فعال بودن سیستم فعال ساز در گرایش به اعتیاد و فعال بودن سیستم بازداری در پیشگیری از اعتیاد می‌تواند مؤثر باشد. لذا با در نظر گرفتن یافته‌های پژوهش می‌توان با شناسایی افرادی که سیستم فعال ساز رفتاری در آن‌ها فعال تر است برنامه‌های آموزشی و رفتاری خاصی را برای پیشگیری از گرایش به اعتیاد در این افراد ارائه داد.

### تشکر و قدردانی

از دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی و مسئولین کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان ارومیه که محققان را در انجام این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماییم.

### منابع

1. Roberts A. Psychiatric comorbidity in white and African-American illicit substance abusers: evidence for differential etiology. *Clin Psychol Rev* 2000; 20: 667-77.
2. Ayyad F, Al Mashaan O. Self esteem, depression and anxiety among addicts. *J Social Sci* 2003; 31: 637-59.
3. Sepah Mansour M. Relationship between Behavioral Activation System (BAS) and Behavioral Inhibition System (BIS) with Students' Capabilities and Behavioral Disorder. *Iran J Psychiatry Clin Psychol* 2010; 5: 57-64. (Persian)
4. Gomez A, Gomez R. Personality traits of the behavioural approach and inhibition systems: associations with processing of emotional stimuli. *Pers Indiv Differ* 2002; 32: 1299-316.
5. Corr PJ, Perkins AM. The role of theory in the psychophysiology of personality: from Ivan Pavlov to Jeffrey Gray. *Int J Psychophysiol* 2006; 62: 367-76.
6. Voigt DC, Dillard JP, Braddock KH, Anderson JW, Sopory P, Stephenson MT. BIS/BAS scales and their relationship to risky health behaviours. *Pers Indiv Differ* 2009; 47: 89-93.
7. Gray JA. Three fundamental emotion systems. *The nature of emotion: Fundamental questions* 1994; 243-7.
8. Depue RA, Iacono WG. Neurobehavioral aspects of affective disorders. *Annual review of psychology* 1989; 40: 457-92.
9. Gray JA, McNaughton N. *The neuropsychology of anxiety: Reprise. Lincoln :Nebraska symposium on motivation; University of Nebraska Press* 1996; 61-

فعالیت در سیستم بازداری رفتاری به احساس‌های اضطراب، نگرانی، نشخوار فکری و ترس می‌انجامد و فرد را متوجه نشانه‌هایی می‌کند که هشداردهنده خطر است. سیستم بازداری رفتاری به نشانه‌های شرطی تنبیه، حذف پاداش و محرک‌های بدیع و تازه حساس است که در پاسخ به تنبیه و نشانه‌های ناکامی بدون پاداش فعال می‌شود [۶۱]؛ بنابراین به نظر می‌رسد فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری فرد را به سمت هیجان، وجد و محرک‌های خوشایند سوق می‌دهد و فرد را برای دریافت پاداش حساس می‌کند بدون اینکه فرد به نتایج منفی عمل خود بیندیشد و فعالیت سیستم بازداری رفتاری فرد را به سمت اجتناب و دوری از تنبیه و نتایج منفی اعمال سوق می‌دهد و به‌عنوان اعلام‌کننده خطر عمل می‌کند. سیستم فعال ساز رفتاری، رفتار گرایشی و سیستم بازداری رفتاری، رفتار اجتنابی را تسهیل می‌کند. در تبیین دیگری می‌توان به عزت‌نفس و پیوندهای اجتماعی و همچنین حمایت خانوادگی اشاره کرد به‌طوری‌که مردان بیش از زنان برای ارتقای عزت‌نفس و برقراری پیوند اجتماعی و به جهت حمایت کم خانوادگی در مقایسه با زنان به مصرف مواد روی می‌آورند. لذا می‌توان گفت اعتیاد یک پدیده زیستی، روانی و اجتماعی است. لذا با تحقیقات بیشتر در سیستم‌های مغزی-رفتاری و نورولوژیکی و فیزیولوژی اعصاب و مغز می‌توان در آینده نسبت به درمان معتادین امیدوار بود. پژوهش حاضر همانند سایر پژوهش‌ها با محدودیت‌هایی نیز روبرو بوده است. اول اینکه به جهت دسترسی بسیار مشکل به زنان معتاد نمونه آماری آن‌ها به اجبار نسبت به مردان کمتر در نظر گرفته شده است. محدودیت دوم استفاده از پرسشنامه خود گزارش دهی است که این مسئله قدرت تعمیم‌پذیری نتایج را با محدودیت روبرو می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی در جهت برطرف کردن محدودیت‌های این پژوهش گام بردارند. یافته‌های پژوهش نشان داد سطح سیستم فعال ساز رفتاری در افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد بالاتر و فعالیت بیشتری از خود نشان می‌دهد. همچنین فعالیت این سیستم در مردان بیشتر از زنان بود ولی تفاوت معنی‌داری در مردان و زنان معتاد مشاهده نگردید. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد سیستم بازداری رفتاری در زنان فعال تر بوده و سطح آن در زنان بالاتر از مردان است. همچنین تفاوت معنی‌داری در سیستم‌های مغزی رفتاری زنان و مردان غیرمعتاد مشاهده گردید. یافته‌های پژوهش حاضر با نظریه حساسیت به تقویت‌گری مبنی بر این که مصرف مواد از فعالیت بیشتر سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) ناشی می‌شود همسو است. لذا به جهت فعال بودن سیستم فعال ساز رفتاری در مردان به نظر می‌رسد مردان زودتر از زنان به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنند و به جهت فعال بودن سیستم بازداری رفتاری (BIS) در زنان احتمال



- 134.
10. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: Reprise. Lincoln :Nebraska symposium on motivation; University of Nebraska Press 1996; 53-98.
11. Pickering A, Gray J. Dopamine, appetitive reinforcement, and the neuropsychology of human learning: An individual differences approach. *Advances in individual differences research* 2001: 113-49.
12. Feldon J, Gary JA, Hamersley DR, Smith AD. The neuropsychology of schizophrenia. *Behav Brain Sci* 1991; 14-9.
13. Fowles DC. The three arousal model: Implications of gray's two-factor learning theory for heart rate, electro dermal activity and psychopath. *Psychophysiology* 1980; 17: 87-104.
14. Dawe S, Loxton NJ. The role of impulsivity in the development of substance use and eating disorders. *Neurosci Biobehav Rev* 2004; 28: 343-51.
15. Balconi M, Falbo L, Brambilla E. BIS/BAS responses to emotional cues: Self report, autonomic measure and alpha band modulation. *Pers Individ Differ* 2009; 47: 858-63.
16. Sutton SK, Davidson RJ. Prefrontal brain asymmetry: a biological substrate of the behavioral approach and inhibition system. *Psychol Sci* 1997; 8: 204-10.
17. Corr PJ, McNaughton N. Reinforcement sensitivity theory and personality. *The reinforcement sensitivity theory of personality* 2008: 155-87.
18. Gray JA. Neural systems, emotion and personality. *Neurobiology of learning, emotion, and affect* 1991; 4: 273-396.
19. Gray JA. A model of the limbic system and basal ganglia: Applications to anxiety and schizophrenia. Cambridge, MA, US: The MIT Press 1995; 1165-76.
20. Hewig J, Hageman D, Seifert J, Naumann E, Bartussek D. The relation of cortical activity and BIS/BAS on the trait level. *Biol Psychol* 2006; 71: 42-53.
21. Gray JA, van Goozen S, Van de Poll N, Sergeant J. Framework for a taxonomy of psychiatric disorder. *Emotions: Essays on emotion theory* 1994: 29-59.
22. Mitchell SN, Brazell MP, Joseph MH, Alavijeh MS, Gray JA. Regionally specific effects of acute and chronic nicotine on rates of catecholamine and 5-hydroxytryptamine synthesis in rat brain. *Eur J Pharmacol* 1989; 167: 311-22.
23. Franken IH, Muris P, Georgieva I. Gray's model of personality and addiction. *Addict Behav* 2006; 31: 399-403.
24. Franken IH, Muris P. BIS/BAS personality characteristics and college students' substance use. *Pers Individ Differ* 2006; 40: 1497-503.
25. Segarra P, Ross SR, Pastor MC, Montanes S, Poy R, Molto J. MMPI-2 predictors of Gray's two-factor reinforcement sensitivity theory. *Pers Individ Differ* 2007; 43: 437-48.
26. Alloy LB, Abramson LY, Walshaw PD, Cogswell A, Grandin LD, Hughes ME, et al. Behavioral Approach System and Behavioral Inhibition System sensitivities and bipolar spectrum disorders: prospective prediction of bipolar mood episodes. *Bipolar disorders* 2008; 10: 310-22.
27. Loxton NJ, Dawe S. Alcohol abuse and dysfunctional eating in adolescent girls: The influence of individual differences in sensitivity to reward and punishment. *Int J Eat Disorder* 2001; 29: 455-62.
28. Hundt NE, Kimbrel NA, Mitchell JT, Nelson-Gray RO. High BAS, but not low BIS, predicts externalizing symptoms in adults. *Pers Individ Differ* 2008; 44: 565-75.
29. Kimbrel NA, Nelson-Gray RO, Mitchell JT. Reinforcement sensitivity and maternal style as predictors of psychopathology. *Pers Individ Differ* 2007; 42: 1139-49.
30. Simons JS, Dvorak RD, Batien BD. Methamphetamine use in a rural college population: associations with marijuana use, sensitivity to punishment, and sensitivity to reward. *Psychol Addict Behav* 2008; 22: 444.
31. Johnson SL, Turner RJ, Iwata N. BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. *J Psychopathol Behav* 2003; 25: 25-36.
32. Fowles DC. Biological variables in psychopathology: A psychobiological perspective. *Comprehensive handbook of psychopathology*: Springer; 2002 85-104.
33. Fowles DC, editor. A motivational theory of psychopathology. *Nebraska symposium on motivation* 1994; 181-238.
34. Kimbrel NA, Nelson-Gray RO, Mitchell JT. Reinforcement sensitivity and maternal style as predictors of psychopathology. *Pers Individ Differ* 2007; 42: 1139-49.
35. Hasking PA. Reinforcement sensitivity, coping, disordered eating and drinking behaviour in adolescents. *Pers Individ Differ* 2006; 40: 677-88.
36. Loxton NJ, Dawe S. Reward and punishment sensitivity in dysfunctional eating and hazardous drink-

- ing women: Associations with family risk. *Appetite* 2006; 47: 361-71.
37. Loxton NJ, Nguyen D, Casey L, Dawe S. Reward drive, rash impulsivity and punishment sensitivity in problem gamblers. *Pers Individ Differ* 2008; 45: 167-73.
38. Heponiemi T, Keltikangas-Järvinen L, Puttonen S, Ravaja N. BIS/BAS sensitivity and self-rated affects during experimentally induced stress. *Pers Individ Differ* 2003; 34: 943-57.
39. Jackson CJ. Gray's reinforcement sensitivity theory: A psychometric critique. *Pers Individ Differ* 2003; 34: 533-44.
40. Schmidtke JI, Heller W. Personality, affect and EEG: Predicting patterns of regional brain activity related to extraversion and neuroticism. *J Pers Individ Differ* 2004; 36: 717-32.
41. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. *J Pers Soc Psychol* 1994; 67: 319.
42. Mohamadi N. The Psychometric Properties of the Behavioral Inhibition System (BIS) and Behavioral Activation System (BAS) scales Among Students of Shiraz University. *Daneshvar Raftar* 2008; 15: 61-8. (Persian)
43. Seyed Mousavi P, Pouretamad HR, Fayazbakhsh MR, Smaeilbeygi F, Farnoodian P. The relationship between behavioral inhibition and activation systems and behavioral and emotional problems in adolescents. *J Res Behav Sci* 2012; 9: 155-163. (Persian)
44. Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, Van Damme P, Santosham M, Rodriguez Z, et al. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine. *New Engl J Med* 2006; 354: 23-33.
45. Choudhury S, Nagel SK, Slaby J. Critical neuroscience: Linking neuroscience and society through critical practice. *BioSocieties* 2009; 4: 61-77.
46. Pickering AD, Gray JA. The neuroscience of personality. *Handbook of personality: Theory and research* 1999; 2: 277-99.
47. Franken IH, Muris P. BIS/BAS personality characteristics and college students' substance use. *Pers Individ Differ* 2006; 40: 1497-503.
48. Fahimi S, Ali Mahdi M, Bakhshi Pour Rudsari A, Mahmud Alilu M. Gray's Biological Model of Personality and Addiction. *Iran J Psychiatry Clin Psychol* 2012; 6: 51-60. (Persian)
49. Abdoullah zadeh A, Hashemi Nosrat Abadi T, Moradi AR, Farzad V. The role of Brain Behavioral Systems in Predicting of Drug Abuse. *J Clin Psychol* 2010; 2: 37-45. (Persian)
50. Alimoradi A, Hoshyar S, Modarres Gharavi M. Brain, behavior, and mental health in substance dependent individuals in comparison to healthy controls. *J Fundam Ment Health* 2012; 13: 304-13. (Persian)
51. Saburi H, Bakhshipoor A, Ashayeri H, Ghaderi Pakdel F, GarusiFarshi M. Effects of Motivation Manipulation on Brain Processing Speed of BIS/BAS people. *Res Clin Psychol and Counsel* 2009; 10: 185-96. (Persian)
52. Nabi-zadeh Gh, Hashemi Nosrat-abad T, Pour sharifi H, Frorshi M. Personality traits and behavioral inhibition/activation systems in patients with schizophrenia, bipolar and normal individuals. *J Clin Psychol* 2010; 2: 51-62. (Persian)
53. Shahandeh M, Aghayusefi AR. Comparison of brain behavioral activation/inhibition systems and locus of control among girls and boys university student. *J Appl Psychol* 2013; 6: 7-26. (Persian)
54. Leone L, Perugini M, Bagozzi RP, Pierro A, Mannetti L. Construct validity and generalizability of the Carver-White behavioural inhibition system/behavioural activation system scales. *Eur J Personality* 2001; 15: 373-90.
55. Jorm AF, Christensen H, Henderson AS, Jacomb PA, Korten AE, Rodgers B. Using the BIS/BAS scales to measure behavioural inhibition and behavioural activation: Factor structure, validity and norms in a large community sample. *Pers Individ Differ* 1998; 26: 49-58.
56. Pourmohseni Koluri F, Haghshenas A, Asadi S. A comparison of brain-behavioral systems and gender differences among addicted and non-addicted persons. *Adv Cogn Sci* 2011; 13: 9-22. (Persian)
57. Babapour Kheiroddin J, Dadashzadeh R, Tousi F. Comparison of Brain / Behavioral Systems (BIS/BAS) among Smokers and Nonsmokers. *J Psychol* 2011; 6: 7-20. (Persian)
58. Newman JP, MacCoon DG, Vaughn LJ, Sadeh N. Validating a distinction between primary and secondary psychopathy with measures of Gray's BIS and BAS constructs. *J Abnorm Psychol* 2005; 114: 319-23.
59. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: an enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. New York: Oxford University 2000; 53-98.
60. Corr PJ. Reinforcement sensitivity theory and personality. *Neurosci Biobehav Rev* 2004; 28: 317-32.
61. Gray JA. Perspectives on anxiety and impulsivity: A commentary. *J Res Pers* 1987; 21: 493-509.